

Introduction to Commutative Algebra - Part2.

Note. 4.E13, 5.E22 (答案有误), 5.E24

作为模有限生成: 有限。

作为代数有限生成: 有限型。

4. 准素分解

4.0 引言

对一个理想做准素分解得到 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 。今后的结论将指出如果这样的分解是极小的, 它对应到代数簇上正是对簇进行不可约分支分解。

4.1 准素理想

定义 (准素理想) 称一个理想 $\mathfrak{q}$ 是准素理想, 如果 $\mathfrak{q} \neq A$ 且 $xy \in \mathfrak{q} \implies x \in \mathfrak{q} \vee y^n \in \mathfrak{q}$ 对某些 $n > 0$ 成立。

从而: $\mathfrak{q}$ 准素 $\iff A/\mathfrak{q} \neq 0$ 且每个零因子都是幂零元。

性质 (准素理想的性质)

素理想准素; 准素理想的局限准素 ($A/\mathfrak{q}^c$ 同构与 $B/\mathfrak{q}$ 的子环)

4.1 ($\mathfrak{p}$ -准素) $\mathfrak{q}$ 是准素理想, 那么 $r(\mathfrak{q})$ 是最小的包含 $\mathfrak{q}$ 的素理想, 记为 $\mathfrak{p}$, 则称 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素的。

证:

由1.8, 只需说明 $r(\mathfrak{q})$ 是素的。若 $xy \in r(\mathfrak{q})$, 则 $(xy)^n \in \mathfrak{q}$ 。从而 $x^n \in \mathfrak{q} \vee y^{mn} \in \mathfrak{q}$ 即 $x \in r(\mathfrak{q}) \vee y \in r(\mathfrak{q})$ 。

Remarks and Examples.

1. $\mathbb{Z}$ 中的情况是熟知的： $(0), (p^n)$ 是全体的准素理想，同时它也是全体根理想为素的理想。但是最后这个论断对于一般的环中并不一定成立。
2. 准素理想不一定具有形式 $\mathfrak{p}^n$ ： $A = k[x, y], \mathfrak{q} = (x, y^2)$ 。 $A/\mathfrak{q} \cong k[y]/(y^2)$ ，其中的零因子是 y 的倍数，从而幂零。于是说明 $\mathfrak{q}$ 的确是准素。然而 $\mathfrak{q}$ 是 (x, y) -准素的，若其具有形式 $\mathfrak{p}^n$ ，一定有 $\mathfrak{p} = (x, y)$ 。但是 $(x, y)^2 \subset \mathfrak{q} \subset (x, y)$ ，从而不可能具有形式 $\mathfrak{p}^n$ 。
3. 根理想为素的理想不一定准素，更进一步地： $\mathfrak{p}^n$ 不一定准素：取
 $A = k[x, y, z]/(xy - z^2)$ ， $\mathfrak{p} = (x, z)$ 。由于 $A/\mathfrak{p} \cong k[y]$ 是整环，因而它的确是素。而对于 $\mathfrak{p}^2$ ： $\bar{x}\bar{y} = \bar{z}^2 \in \mathfrak{p}^2$ ，但是 $\bar{x} \notin \mathfrak{p}^2, \bar{y} \notin \mathfrak{p}^2$ ，从而它并不准素。

尽管有Remark3.的反例存在，将根理想为素这一条件更换为根理想极大则能够得到结论成立。

4.2 $r(\mathfrak{a})$ 极大，则 $\mathfrak{a}$ 准素。特殊地，给定极大理想 $\mathfrak{m}$ ， $\mathfrak{m}^n$ 准素。

证：

$r(\mathfrak{a})$ 在 $A/\mathfrak{a}$ 中的像仍然极大，并且是幂零根。那么 $A/\mathfrak{a}$ 局部，从而 $A/\mathfrak{a}$ 中元素要么是单位，要么是幂零元。（若有一个非单位非幂零元的元素，它应该被某个极大理想包含，于是矛盾）

4.2 准素分解

4.3 (p -交 p -还是 p -) 对于 p -准素理想 $\mathfrak{q}_i$ ， $\mathfrak{q} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 仍然是 p -准素的。

证：

$r(\mathfrak{q}) = \bigcap r(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}$ 。令 $xy \in \mathfrak{q}, y \notin \mathfrak{q}$ ，即存在某个 $i, xy \in \mathfrak{q}_i, y \notin \mathfrak{q}_i$ ，从而说明 $x \in \mathfrak{p}$ ，进而准素。

4.4 (准素理想的商理想) 设 $\mathfrak{q}$ 是 p -准素的， $x \in A$ 。

4.4.1 $x \in \mathfrak{q}$ ，则 $(\mathfrak{q} : x) = (1)$

4.4.2 $x \notin \mathfrak{q}$ ，则 $(\mathfrak{q} : x)$ 是 p -准素的。

4.4.3 $x \notin \mathfrak{p}$ ，则 $(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}$

证：

4.4.1 显然

4.4.2 $y \in (\mathfrak{q} : x) \iff xy \in \mathfrak{q} \implies y \in r(\mathfrak{q}) \implies y \in \mathfrak{p}$ ，于是 $\mathfrak{q} \subseteq (\mathfrak{q} : x) \subseteq \mathfrak{p}$ 。两侧取根理想， $r(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{p}$ 。

若 $yz \in (\mathfrak{q} : x)$ ，并且 $y \notin \mathfrak{p}$ ，则 $xyz \in \mathfrak{q}$ ，从而 $xz \in \mathfrak{q}$ ，于是 $z \in (\mathfrak{q} : x)$ ，从而说明了准素。

4.4.3 有定义显然。

准素分解是将一个理想分解成有限个准素理想的交的过程。（尽管这个分解并不总是一定存在，但是它在代数几何中意义是明显的）

更进一步地，如果：1. $r(q_i)$ 各不相同；2. $q_i \not\supseteq \bigcap_{j \neq i} q_j$ 。那么称这个准素分解是极小的。每个准素分解都可以被约化为极小准素分解。

证：

1. 条件利用4.3可以取到。

2. 若 $q_i \supseteq \bigcap_{j \neq i} q_j$ ，将 q_i 除掉即可。

接下来研究可准素分解理想的准素分解的唯一性。

4.5（第一唯一性定理） 设 $\mathfrak{a}$ 可准素分解，对于极小准素分解 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n q_i$ ，取 $\mathfrak{p}_i = r(q_i)$ ，则 $\mathfrak{p}_i$ 是全体 $\{r(\mathfrak{a} : x) | x \in A\} \cap \text{Spec}(A)$ ，进而与准素分解的选取无关。

证：由于 $(\mathfrak{a} : x) = \bigcap (q_i : x)$ ，那么 $r(\mathfrak{a} : x) = \bigcap r(q_i : x) \stackrel{4.4}{=} \bigcap_{x \notin q_i} \mathfrak{p}_i$

若 $r(\mathfrak{a} : x)$ 素，由包容引理1.11，有 $r(\mathfrak{a} : x) = \mathfrak{p}_i$

反过来，对于每个 i ，存在 $x_i \notin q_i, x_i \in \bigcap_{j \neq i} q_j$ ，那么 $r(\mathfrak{a} : x_i) = \mathfrak{p}_i$ 。

于是说明了定理的正确性。

Cor. 对于每个 i ，存在 $x_i \in A, (\mathfrak{a} : x_i)$ 是 $\mathfrak{p}_i$ -准素的。

Cor. 对于 A -模 $A/\mathfrak{a}$ ， $\mathfrak{p}_i$ 正是 $A/\mathfrak{a}$ 中每个元素的零化理想的根理想与 $\text{Spec}(A)$ 的交。

Rmk. 准素分解并不一定唯一。

沿用4.5的记号，称素理想 $\mathfrak{p}_i$ 属于理想 $\mathfrak{a}$ 。那么： $\mathfrak{a}$ 准素当且仅当仅有一个素理想属于它。极小准素分解中对应的那些素理想中的极小元 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 称为孤立素理想（又称极小素理想，4.6解释了为什么这个名称是不会引起歧义的），而其余的素理想则称为嵌入素理想。（注意：极小的准素分解并不能保证对应的素理想之间不存在包含关系）

孤立和嵌入的例子在考虑代数簇时有了直观的几何意义：例如取 $A = k[x, y], \mathfrak{a} = (x^2, xy)$ ，则 $\mathfrak{a} = (x) \cap (x, y)^2$ ，但是 $(x) \subseteq (x, y)$ ，从而 (x) 是孤立的， (x, y) 是嵌入的。

对应到理想对应的代数簇上，此时 $\mathfrak{a}$ 当然对应的直线 $x = 0$ ，因此 (x) 是孤立的在几何层面上是显然的，而 (x, y) 正是对应着一个嵌入的子簇 $(0, 0)$ 。

这解释了为什么在4.0中提到的准素分解正是不可约分支分解。

直觉提示孤立素理想和极小素理想相近，接下来的性质表明它们完全相同。

4.6 (孤立素理想是极小素理想) $\mathfrak{a}$ 可分解，那么每个素理想 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ 都包含着一个从属的素理想。从而孤立素理想（即从属素理想的极小元）正是全体包含 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想。

证：

$\mathfrak{p} \supseteq \bigcap \mathfrak{q}_i$ ，则 $\mathfrak{p} = r(\mathfrak{p}) \supseteq \bigcap r(\mathfrak{q}_i) = \bigcap r(\mathfrak{p}_i)$ ，由1.11回避引理， $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立，从而得证。

4.3 准素理想与局部化

4.8 S 乘性子集， $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素的。

1. 如果 $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$ ， $S^{-1}\mathfrak{q} = S^{-1}A$

2. 如果 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$ ，那么 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 是 $S^{-1}\mathfrak{p}$ -准素的，并且它的局限是 $\mathfrak{q}$ 。进而同理3.11中的素理想对应，准素理想之间也是存在对应的。

证：

4.8.1 $s \in S \cap \mathfrak{p} \implies s^n \in S \cap \mathfrak{q}$ 对某个 n 成立

$$\implies s^n/1 \in S^{-1}\mathfrak{q} \implies 1/1 \in S^{-1}\mathfrak{q} \implies S^{-1}\mathfrak{q} = S^{-1}A$$

4.8.2 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$ ，于是 $s \in S, as \in \mathfrak{q} \implies a \in \mathfrak{q}$ ，从而由3.11 $\mathfrak{q}^{ec} = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{q} : s) = \mathfrak{q}$ 。

这里的扩张和局限是在环同态 $A \rightarrow S^{-1}A$ 下的。

于是 $r(S^{-1}\mathfrak{q}) = S^{-1}r(\mathfrak{q}) = S^{-1}\mathfrak{p}$ ，并且 $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{q} \cong S^{-1}(A/\mathfrak{q})$

若 $[a]/s \cdot [a']/s' = 0$ ($[a']/s \neq 0$), 即 $\exists t \in S, [aa']t = 0$, 那么 $[a] \cdot [a't] = 0$, 由于 $[a']/s \neq 0$, 当然 $[a't] \neq 0$, 从而 $[a]$ 是零因子, 于是幂零, 从而 $[a]/s$ 幂零, 这就说明了 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 准素。

由4.8.2的结果, 记 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 的局限为 $S(\mathfrak{a})$, 那么 $S(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}$, 自然想问一般的理想在 $S(-)$ 下的表现如何。

4.9 ($S(-)$ 的性质) 设 $\mathfrak{a}$ 有准素分解 $\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$, $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$, 且 S 和 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_m$ 不交, 但和 $\mathfrak{p}_{m+1}, \dots, \mathfrak{p}_n$ 相交。那么:

$$S^{-1}\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^m S^{-1}\mathfrak{q}_i, \quad S(\mathfrak{a}) = \bigcap_{i=1}^m \mathfrak{q}_i$$

并且这两者仍然是准素分解。

证:

第一式显然, $S^{-1}\mathfrak{q}_i$ 准素 (由4.8.)

$$\text{而 } S(\mathfrak{a}) = (S^{-1}\mathfrak{a})^c = \bigcap_{i=1}^m (S^{-1}\mathfrak{q}_i)^c = \bigcap_{i=1}^m \mathfrak{q}_i$$

称一族从属于理想 $\mathfrak{a}$ 的素理想族 Σ 是孤立的, 如果 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p} \in \Sigma \implies \mathfrak{p}' \in \Sigma$.

对于一个孤立素理想族, $S = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \Sigma} \mathfrak{p}$ 是乘性子集, 且对于任何从属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想 $\mathfrak{p}'$,

$$\mathfrak{p}' \in \Sigma \implies \mathfrak{p}' \cap S = \emptyset;$$

$$\mathfrak{p}' \notin \Sigma \implies \mathfrak{p}' \notin \bigcup_{\mathfrak{p} \in \Sigma} \mathfrak{p} \text{ (1.11)} \implies \mathfrak{p}' \cap S = \emptyset.$$

于是, 结合4.9和这个结论, 得到:

4.10 (第二唯一性定理) 设 $\mathfrak{a}$ 可分解, $\mathfrak{a} = \bigcap \mathfrak{q}_i$ 是极小准素分解, $\Sigma = \{\mathfrak{p}_{i_1}, \dots, \mathfrak{p}_{i_m}\}$ 是孤立素理想族, 那么 $\mathfrak{q}_{i_1} \cap \dots \cap \mathfrak{q}_{i_m}$ 与分解无关。

证: $\mathfrak{q}_{i_1} \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_{i_m} = S(\mathfrak{a})$, 其中 $S = A - \mathfrak{p}_{i_1} \cup \cdots \cup \mathfrak{p}_{i_m}$ 由第一唯一性定理与分解无关。

做为推论, 有:

4.11 (孤立分支唯一) 孤立准素分支 (即孤立素理想 $\mathfrak{p}_j$ 对应的准素理想 $\mathfrak{q}_j$) 被 $\mathfrak{a}$ 唯一决定。

证: 取 Σ 为一个极小素理想组成的单元集即可。

4.4 可分解理想

最后我们讨论一些可分解理想的性质。

4.7 $\mathfrak{a}$ 是可分解理想, 给定极小准素分解 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$, 以及 $r(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}_i$, 那么

$$\bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i = \{x \in A \mid (\mathfrak{a} : x) \neq \mathfrak{a}\}$$

证:

过渡到商环: 如果 $\mathfrak{a}$ 可分解, 那么在商环 $A/\mathfrak{a}$ 中 0 理想可分解。即 $0 = \bigcap \bar{\mathfrak{q}}_i$, 其中后者是 $\mathfrak{q}_i$ 在商环中的像, 也是准素的。

(注记: 如果 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{q}$, 那么 $\overline{r(\mathfrak{q})} = r(\bar{\mathfrak{q}})$; 更进一步地如果 $\mathfrak{q}$ 是准素的, 那么 $\bar{\mathfrak{q}}$ 也是准素的)

由上, 只需说明零理想的极小准素分解对应的素理想的并是全体零因子, 记零因子集合为 D , 那么:

$D = \bigcup_{x \neq 0} r(0 : x)$, 而由 4.5 的证明 $r(0 : x) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_j} \mathfrak{p}_j \subseteq \mathfrak{p}_j$ 对某些 j 成立。从而 $D \subseteq \bigcup \mathfrak{p}_i$, 但是 4.5 也说明了 $\mathfrak{p}_i$ 具有形式 $r(0 : x)$, 于是得证。

4.5(E)

1. $\mathfrak{a}$ 如果存在准素分解, 那么 $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 仅有有限个不可约分支。

证:

由1.20, $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 的不可约分支为全体 $V(\overline{\mathfrak{p}})$, 其中 $\mathfrak{p}$ 为包含 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想。由于准素分解存在, 取出极小准素分解, 那么包含 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想当然有限个, 于是结论自明。

2. $\mathfrak{a} = r(\mathfrak{a})$, 那么 $\mathfrak{a}$ 不含有嵌入素理想。

证:

$r(\mathfrak{a})$ 一定可分解。

给定一个极小准素分解 $\mathfrak{a} = \cap \mathfrak{q}_i$, $\mathfrak{a} = r(\mathfrak{a}) = \cap r(\mathfrak{q}_i) = \cap \mathfrak{p}_i$, 那么后者也是 $\mathfrak{a}$ 的一个极小准素分解。于是自然不存在嵌入分支。

3. 如果 A 绝对平坦, 那么每个素理想都是极大的。

证:

对于一个素理想 $\mathfrak{p}$, 对于 $x \in A - \mathfrak{p}$, 由于主理想幂等, $\exists a \in A, x = ax^2$, 即 $x(ax - 1) = 0$ 。

那么在 $A/\mathfrak{p}$ 中 $\overline{x}(\overline{ax} - \overline{1}) = \overline{0}$ 。然而 $\overline{ax} - \overline{1}$ 是零因子, 于是只有 $\overline{ax} = \overline{1}$ (整环), 从而 $\overline{x}$ 是单位。

4. 对于环 $\mathbb{Z}[t]$, 理想 $\mathfrak{m} = (2, t)$ 是极大的, $\mathfrak{q} = (4, t)$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素的, 但不是 $\mathfrak{m}$ 的幂。(4.2的逆命题反例)

证: $\mathbb{Z}[t]/\mathfrak{m} = F_2$, 于是说明极大。 $\mathbb{Z}[t]/\mathfrak{q} = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 那么每个零因子(2)是幂等的($2^2 = 0$), 从而说明准素。

由于 $\mathfrak{q} = \{tP(t) + 4c\}$

$f^m \in \mathfrak{q} \iff f$ 的常数项是2的倍数。于是 $r(\mathfrak{q}) = \{tP(t) + 2c\} = \mathfrak{m}$

而 $\mathfrak{m} \supset \mathfrak{q} \supset \mathfrak{m}^2$, 从而说明了结论。

5. 对于域上的多项式环 $K[x, y, z]$, $p_1 = (x, y)$; $p_2 = (x, z)$; $m = (x, y, z)$ 。证明 $p_{1,2}$ 是素的, m 是极大的。取 $a = p_1 p_2$, 说明 $a = p_1 \cap p_2 \cap m^2$ 是极小准素分解, 指出孤立分支和嵌入分支。

证:

不难验证极小准素分解。孤立分支为 (x, y) ; (x, z) , 嵌入分支为 (x, y, z) 。

6. X 是无限元素的紧 Hausdorff 空间, $C(X)$ 是其上连续实值函数环。在这个环中零理想是否可以分解?

证:

如果零理想可以分解, 那么 $\text{Spec}(C(X))$ 仅存在有限个不可约分支。然而 m_x, m_y 从属于不同的不可约分支, 且 x, y 选择无限, 矛盾。

7. 给定环 A , 其上多项式环 $A[x]$ 。对理想 a , 有集合 $a[x]$ 。

7.1 对于环同态 $A \rightarrow A[x]$, $a[x] = a^e$ 。

7.2 p 素, 则 $p[x]$ 素。

7.3 q 是 p -准素, 那么 $q[x]$ 是 $p[x]$ -准素。

7.4 对于极小准素分解 $a = \cap q_i$, $a[x] = \cap q_i[x]$ 也是极小准素分解。

7.5 p 极小, 则 $p[x]$ 极小。

证:

7.1 注意到 $a \cdot A[x] = a[x]$, 则命题显然。

7.2 即 2.E7.

7.3 首先说明准素: $A[x]/\mathfrak{q}[x] \cong (A/\mathfrak{q})[x]$, 则对于任何 $(A/\mathfrak{q})[x]$ 中的零因子, 设为 f , 那么由1.E2.3, 存在 $t(\neq 0) \in A/\mathfrak{q}$ 使得 $tf = 0$, f 的每个系数都是零因子。而在 $A/\mathfrak{q}$ 中零因子都是幂零元, 再次运用1.E.2.2, 即有 f 幂零。

接下来说明 $\mathfrak{p}[x]$ -准素。

$$\begin{aligned} r(\mathfrak{q}[x]) &= r(\mathfrak{q} \cdot (x) + \mathfrak{q}) = r(r(\mathfrak{q}) + r(\mathfrak{q} \cdot (x))) = r(\mathfrak{p} + r(\mathfrak{q}) \cap r((x))) \\ &= r(\mathfrak{p}[x]) = \mathfrak{p}[x] \end{aligned}$$

7.4 只需说明极小性。根理想互不相同是显然的; 包含性是显然的。

7.5 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}$ 自然是极小准素分解, 那么 $\mathfrak{p}[x] = \mathfrak{p}[x]$ 也是。于是 $\mathfrak{p}[x]$ 从属于 $\mathfrak{p}[x]$, 自然是极小素理想。

8. 给定域 k , 其上多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 。证明理想 $\mathfrak{p}_i = (x_1, \dots, x_i)$ 是素的, 并且它的任意次幂是准素的。

证:

$A/\mathfrak{p}_i = k[x_{i+1}, \dots, x_n]$ 当然是整环。

考虑 $xy \in \mathfrak{p}_i^m$, 那么 xy 只含有 $x_1, \dots, x_i$, 没有常数项, 并且每项次数至少为 m 。于是利用整除理论, 如果 $x \notin \mathfrak{p}_i^m$, 当然只能有 $y^n \in \mathfrak{p}_i^m$ 。

9.1 对于环 A , $D(A)$ 指满足以下条件的素理想构成的集合: $\exists a \in A$, 使得 $\mathfrak{p}$ 是所有包含 $(0 : a)$ 的素理想中极小的。证明: $x \in A$ 是零因子 $\iff x \in \mathfrak{p}$ 对某个 $\mathfrak{p} \in D(A)$ 成立。

9.2 如果 S 是 A 的乘性子集, 将 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 视作 $\text{Spec}(A)$ 的子集(3.E21), 那么 $D(S^{-1}A) = D(A) \cap \text{Spec}(S^{-1}A)$

9.3 如果零理想可分解, 证明 $D(A)$ 是全体从属于它的素理想集合。

证:

9.1 如果 x 是零因子, 那么 $x \in \mathfrak{a} = (0 : a)$, 于是自然属于某个包含 $(0 : a)$ 中极小的素理想。

反过来如果 x 属于某个包含 $(0 : a)$ 的极小素理想, 不妨设 $x \in \mathfrak{p}$, 其中后者是包含 $\mathfrak{a} = (0 : a)$ 的素理想中的极小元。那么由2.E9, x 在 $A/\mathfrak{a}$ 中是零因子。即 $\exists y, xy \in \mathfrak{a}$, 从而 $xya = 0$ 即证。

9.2 首先
$$S^{-1}Ann(x) = Ann(x)^e = S^{-1}((0) : (x)) = (S^{-1}(0) : S^{-1}(x))$$
, 并且
$$= Ann(S^{-1}(x)) = Ann(x/1)$$

$$Ann(x/s) = Ann(x/1).$$

而 $S^{-1}A$ 的每个素理想都是扩张理想 (3.11), 因此可记为 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 。那么 $S^{-1}\mathfrak{p} \in D(S^{-1}A) \iff \exists x, S^{-1}\mathfrak{p}$ 是包含 $Ann(x/s) = Ann(x/1) = S^{-1}Ann(x)$ 的极小素理想。那么 $\mathfrak{p}$ 也是包含 $Ann(x)$ 的极小素理想, 从而说明了 $D(S^{-1}A) = D(A) \cap Spec(S^{-1}A).$

9.3 由4.5,4.7, 零理想的从属素理想是全体 $r(0 : x)$ 中出现的素理想, 于是 $\{associative\ to\ 0\} \subseteq D(A).$

反过来对于 $\mathfrak{p} \in D(A)$, 设 x 使得 $\mathfrak{p}$ 是包含 $\mathfrak{a} = (0 : x)$ 的极小素理想, 即 $\mathfrak{p}$ 是由零因子组成的素理想。

由4.5的证明 $r(0 : x) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_j} \mathfrak{p}_j$, 那么 $\mathfrak{p} \supseteq \bigcap \mathfrak{p}_j$, 由1.11必定有 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}_j$ 对某个 j 成立。但与此同时 $\mathfrak{p}_j$ 也包含着 $(0 : x)$, 于是由 $\mathfrak{p}$ 的极小性, 只能有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_j$ 成立, 从而证明了结论。

10. 对于任何环 A 的素理想 $\mathfrak{p}$, 记 $S_{\mathfrak{p}}(0)$ 是同态 $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ 的核。证明:

10.1 $S_{\mathfrak{p}}(0) \subseteq \mathfrak{p}$

10.2 $r(S_{\mathfrak{p}}(0)) = \mathfrak{p} \iff \mathfrak{p}$ 极小。

10.3 如果 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}'$, 那么 $S_{\mathfrak{p}}(0) \subseteq S_{\mathfrak{p}'}(0)$

10.4 $\bigcap_{\mathfrak{p} \in D(A)} S_{\mathfrak{p}}(0) = 0$, 其中 $D(A)$ 的定义见4.E9.

证:

10.1 显见这里 $S_p(0)$ 和正文（定理4.9）前的 $S(a)$ 的定义是一致的。

如果 $x \notin p$ ，且 $x/1 = 0$ 。即 $\exists s \in A - p, xs = 0 \in p$ ，矛盾。

10.2

$\Leftarrow$ 方向是显然的。

对于 $\Rightarrow$ ，假定 $p = r(S_p(0))$ 。则 $\forall x \in p \iff \exists n, \exists s \in A - p, x^n s = 0$ 。

若存在素理想 $q \subset p$ ，必定存在 $x \in p$ ，但 $x \notin q$ 。由于存在 $s \in A - p, x^n s = 0$ ，且 $s \notin q$ ，那么只能有 $x^n \in q$ 。但是由素理想性质以及 $x \notin q$ 立刻得到矛盾。

10.3

注意： $x \in S_p(0) \iff \exists s \in A - p, xs = 0 \iff x \in \bigcup_{s \in A - p} \text{Ann}(s)$ ，于是命题显然。

10.4

若 $x \neq 0$ ，选出 $(0 : x)$ 的一个极小素理想 p ，那么在 A_p 中 $x/1$ 如果为0就要求 $\exists s \in A - p, sx = 0$ 。即 $s \in (0 : x) \subseteq p \wedge s \in A - p$ ，这是不可能做到的。于是 $x \notin S_p(0)$ ，得证。

11.1 p 是极小素理想，那么 $S_p(0)$ 是最小的 p -准素理想。

11.2 记 $a = \bigcap_{p \text{ minimal}} S_p(0)$ ，则 $a \in \mathfrak{R}(A)$

11.3 如果在环 A 中零理想可分解，那么 $a = 0 \iff 0$ 的所有从属素理想都是孤立的。

证：

11.1 首先有 $r(S_p(0)) = p$ (4.E10.2)，其次如果 $xy \in S_p(0)$ ，存在 $s \in A - p, sxy = 0$ ，再设 $y \notin S_p(0)$ ，即 $sy \neq 0$ ，于是 $x/1$ 在局部环 A_p 中是零因子。然而 p 是极小的，于是在 A_p 中不再存在除了极大理想 pA_p 以外的理想。然而零因子非单位，于是一定能够包含在极大理想内，进而 $x/1 \in pA_p$ ，即 $x \in p = r(S_p(0))$ ，从而说明了准素。

对于任何一个 $\mathfrak{p}$ -准素理想 $\mathfrak{q}$ ，由于 $r(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ ，必定有 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$ 。对于任意给定的 $x \in S_{\mathfrak{p}}(0)$ ，那么 $\exists s \in A - \mathfrak{p}, sx = 0$ 。若 $x \notin \mathfrak{q}$ ，由于 $0 \in \mathfrak{q}$ ，只能有 $s \in r(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ ，矛盾。

于是以上内容说明了结论。

11.2 $\mathfrak{a}$ 包含在所有极小素理想内，进而包含在所有素理想内，于是结论自明。

11.3 如果 $0 = \cap S_{\mathfrak{p}_i}(0)$ ，它的从属素理想族是极小素理想族的子族，自然孤立。

反过来假定准素分解中 0 的从属素理想都是孤立的：4.E10.4表明 $0 = \cap_{\mathfrak{p} \in D(A)} S_{\mathfrak{p}}(0)$ 是准素分解。

如果 $S_{\mathfrak{p}_i}(0) \supseteq \cap_{other} S_{\mathfrak{p}}(0)$ ，那么将其约化掉得到了更小的准素分解，从而 0 从属素理想族是 $D(A)$ 的真子族，矛盾！于是 $0 = \cap_{\mathfrak{p} \in D(A)} S_{\mathfrak{p}}(0)$ 是约化准素分解。同时从属素理想均孤立表明 $D(A)$ 正是极小素理想族，于是自然有 $0 = \cap_{\mathfrak{p} \in D(A)} S_{\mathfrak{p}}(0) = \cap_{\mathfrak{p} \text{ minimal}} S_{\mathfrak{p}}(0) = \mathfrak{a}$

12. 设 A 是环， S 是乘性子集， $S(\mathfrak{a})$ 记号意义同前。称 $S(\mathfrak{a})$ 为 $\mathfrak{a}$ w.r.t. S 的饱和化，证明：

$$12.1 \quad S(\mathfrak{a}) \cap S(\mathfrak{b}) = S(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$$

$$12.2 \quad S(r(\mathfrak{a})) = r(S(\mathfrak{a}))$$

$$12.3 \quad S(\mathfrak{a}) = (1) \iff \mathfrak{a} \cap S \neq \emptyset$$

$$12.4 \quad S_1(S_2(\mathfrak{a})) = (S_1 S_2)(\mathfrak{a})$$

12.5 如果 $\mathfrak{a}$ 存在准素分解，那么理想族 $S(\mathfrak{a})$ （ S 取遍全体乘性子集）是有限的。

证：

$$12.1 \quad \text{由1.18, } S(\mathfrak{a}) \cap S(\mathfrak{b}) = (S^{-1}\mathfrak{a} \cap S^{-1}\mathfrak{b})^c = [S^{-1}(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})]^c = S(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$$

12.2 由1.18显然。

$$12.3 \quad S(\mathfrak{a}) = (1) \iff A \subseteq S^{-1}\mathfrak{a} \iff 1/1 \in S^{-1}\mathfrak{a} \iff \mathfrak{a} \cap S \neq \emptyset$$

12.4 只需回忆3.E3.

12.5 由定理4.9, 结论显然。(至多 2^m 个)

13. 在环 A 中记素理想 $\mathfrak{p}$ 的 n -次形式幂 $\mathfrak{p}^{(n)}$ 为 $S_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{p}^n)$, 证明:

13.1 $\mathfrak{p}^{(n)}$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素的。

13.2 如果 $\mathfrak{p}^n$ 存在准素分解, 那么 $\mathfrak{p}^{(n)}$ 是它的 $\mathfrak{p}$ -准素分支。

13.3 如果 $\mathfrak{p}^{(m)}\mathfrak{p}^{(n)}$ 存在准素分解, 那么 $\mathfrak{p}^{(m+n)}$ 是它的 $\mathfrak{p}$ -准素分支。

13.4 $\mathfrak{p}^{(n)} = \mathfrak{p}^n \iff \mathfrak{p}^n$ 准素。

证:

13.1 首先 $r(\mathfrak{p}^{(n)}) = r(S_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{p}^n)) = (r(S_{\mathfrak{p}}^{-1}\mathfrak{p}^n))^c = (S_{\mathfrak{p}}^{-1}\mathfrak{p})^c$ (注意 $S_{\mathfrak{p}}^{-1}\mathfrak{p}$ 是唯一的极大理想)

那么 $r(\mathfrak{p}^{(n)}) = \mathfrak{p}$.

由4.2, $S_{\mathfrak{p}}^{-1}\mathfrak{p}^n$ 是 $S_{\mathfrak{p}}^{-1}\mathfrak{p}$ -准素的, 从而由4.8知准素性。

13.2

14. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 的可分解理想, $\mathfrak{p}$ 是 $(\mathfrak{a} : x)$ 中的极大者 (其中 $x \in A - \mathfrak{a}$) 证明 $\mathfrak{p}$ 是从属于 A 的素理想。

证: 如果 $\mathfrak{p}$ 是素的, 那么 $r(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$, 自然得到结论。

设 $\mathfrak{p} = (\mathfrak{a} : m)$, $xy \in \mathfrak{p}$, i.e. $xym \in \mathfrak{a}$ 。如果 $xm, ym \notin \mathfrak{a}$, 那么考虑 $(\mathfrak{a} : xm)$ 。首先 $xm \in A - \mathfrak{a}$, 其次注意到 $sm = 0 \implies sxm = 0$, 而后 $y \notin \mathfrak{p}$, 但是 $y \in (\mathfrak{a} : xm)$, 于是 $(\mathfrak{a} : m) \subset (\mathfrak{a} : xm)$, 与极大性矛盾! 从而证明了结论。

15. 设 $\mathfrak{a}$ 在环 A 中可分解, Σ 是 $\mathfrak{a}$ 的孤立的素理想族。 q_Σ 是这族中素理想对应的准素理想的交。 $f \in A$ 满足对于每个从属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$, 均有 $f \in \mathfrak{p} \iff \mathfrak{p} \notin \Sigma$ 。 $S_f = \{f^n | n \in \mathbb{N}\}$, 证明 $q_\Sigma = S_f(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a} : f^n)$ 对于充分大的 n 成立。

证:

由4.9, $S_f(\mathfrak{a}) = q_\Sigma$ 成立。

由于 $(\mathfrak{a} : f^n) = \bigcap_{r(q_i) \notin \Sigma} (q_i : f^n) \cap \bigcap_{r(q_i) \in \Sigma} (q_i : f^n)$

对于充分大的 n , 若 $r(q_i) \notin \Sigma$, 那么 $f \in \mathfrak{p}_i = r(q_i)$, 于是当然可假定对于 $n > N$, $f^n \in q_i, \forall r(q_i) \notin \Sigma$, 即 $(q_i : f^n) = A$.

若 $r(q_i) \in \Sigma$, 那么 $f^n \notin q_i$, 于是只能有 $(q_i : f^n) = q_i$, 故 $(\mathfrak{a} : f^n) = q_\Sigma$ 对 $n > N$ 均成立。

16. A 的每个理想都存在准素分解, 那么对于任何一个分式环 $S^{-1}A$ 也满足每个理想存在准素分解。

证: 由于 $S^{-1}A$ 中的每个理想都是 A 中理想的扩张, 那么由4.9结论显然。

环中任一理想存在准素分解的条件

17. 对于满足以下条件的环 A :

L1. 对每个非 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 和每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 $x \notin \mathfrak{p}$ 满足 $S_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a} : x)$, 其中 $S_{\mathfrak{p}} = A - \mathfrak{p}$ 。

那么 A 中每个理想都是若干(可能无穷)准素理想的交。

证:

假定 $\mathfrak{a}$ 是非 A 理想, $\mathfrak{p}_1$ 是包含 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想。由4.E11, $q_1 = S_{\mathfrak{p}_1}(\mathfrak{a})$ 是 $\mathfrak{p}_1$ -准素理想, 且由条件 $q_1 = (\mathfrak{a} : x)$ 对某个 $x \notin \mathfrak{p}_1$ 成立。

显然 $\mathfrak{a} \subseteq (\mathfrak{a} : x) \cap (\mathfrak{a} + (x))$ 。反过来，若 $y = a + tx$ 满足 $yx \in \mathfrak{a}$ ，于是 $tx^2 \in \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{q}_1$ 。然而 $x \notin \mathfrak{p}_1 = r(\mathfrak{q}_1)$ ，即 $x^n \notin \mathfrak{q}_1$ ，但是 $tx^2 \in \mathfrak{q}_1$ ，于是只能有 $t \in \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{a} : x)$ 。因此 $tx \in \mathfrak{a}$ ，从而 $y \in \mathfrak{a}$ ，故反包含得证。

故： $\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap (\mathfrak{a} + (x))$

现在令 $\mathfrak{a}_1$ 是集合 $\{\mathfrak{b} \mid \mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{a} \wedge \mathfrak{q}_1 \cap \mathfrak{b} = \mathfrak{a}\}$ 中极大元（存在性可以直接应用Zorn引理）。选取 $\mathfrak{a}_1$ 使得 $x \in \mathfrak{a}_1$ ， $\mathfrak{a}_1 \not\subseteq \mathfrak{p}_1$ 。

反复重复上述构造，构造到第 n 次时我们有 $\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_n \cap \mathfrak{a}_n$ ， $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 准素，并且 $\mathfrak{a}_n$ 是满足 $\mathfrak{a}_{n-1} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{q}_n$ ， $\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_n \cap \mathfrak{b}$ ， $\mathfrak{b} \not\subseteq \mathfrak{p}_n$ 中极大的 $\mathfrak{b}$ 。

如果 $\mathfrak{a}_n = (1)$ 对某步成立，构造终止。

否则注意到 $\mathfrak{a}_{n-1} \subset \mathfrak{a}_n$ 由超穷归纳法结论成立。

Remark. 超穷归纳法

对于一个关于序数的命题 $P(n)$ （其中序数是指典范选取出的良序集）

如果 $P(0)$ 成立；对于任何 $a \leq e$ （其中 e 是一个恒定的序数）如果假定 $\forall b < a P(b)$ 成立能够推出 $P(a)$ 成立：

那么 $P(n)$ 对所有 $n \leq e$ 成立。

更一般地，如果条件中去掉 $a \leq e$ 中的 $\leq e$ ，那么能够说明 $P(n)$ 对任何序数成立。

18. 给定以下关于环 A 的性质：

L2. 任给一理想 $\mathfrak{a}$ 和乘性子集的降链 $S_1 \supseteq S_2 \supseteq \cdots$ ，那么对应的理想降链 $S_1(\mathfrak{a}) \supseteq S_2(\mathfrak{a}) \supseteq \cdots$ 稳定。

那么 A 的每个理想都有准素分解 $\iff A$ 满足 $L1, L2$ 两个条件

证:

$\implies$

$L1$: 由4.9, $S_p(a) = \bigcap_{p_i \subseteq p} q_i$, 容易验证这些 p_i 构成了一个孤立族 Σ 。由4.E15, 取 $f \in \bigcap_{p \notin \Sigma, p \text{ associated to } a} p - p$, 这当然是可以取到的。可以验证它满足4.E15中 f 的条件, 那么 $S_p(a) = q_\Sigma = (a : f^n)$ 。

$L2$: 给定 a 的准素分解 $q_1 \cap \cdots \cap q_n$, 由4.9 $S_k(a) = \bigcap_{S \cap p_i = \emptyset} q_i$, 于是收缩 S_k , 最终得到的 $S_k(a)$ 也会稳定。

$\impliedby$

保持4.E17的记号:

如果 $S_n = S_{p_1} \cap \cdots \cap S_{p_n}$, 归纳地说明 S_n 与 a_n 有交:

$n = 1$ 时情况显然, 因为 $a_1 \not\subseteq p_1$, 则 $S_1 = S_{p_1}$ 与 a_1 有交。

假定 $n - 1$ 情况已证, $a_n \cap q_n = a_{n-1}$ 与 S_{n-1} 有交; 由于 $a_n \not\subseteq p_n$, 那么 S_{p_n} 与 a_n 有交。

于是 a_n 同时与 S_{n-1} 和 S_{p_n} 有交, 同时 $a_{n-1} \cap S_{n-1} \subseteq q_n \subseteq p_n \subseteq S_{p_n}$, 且当然 $a_{n-1} \cap S_{n-1} \subseteq a_n$

那么

$$S_n \cap a_n = (S_{n-1} \cap a_n) \cap (S_{p_n} \cap a_n) \supseteq (S_{n-1} \cap a_{n-1}) \cap (S_{p_n} \cap a_n) = S_{n-1} \cap a_{n-1} \neq \emptyset$$

于是 $S_n(a_n) = (1)$, 进一步地 $S_n(a) = S_n(q_1) \cap \cdots \cap S_n(q_n) \cap S_n(a_n) = q_1 \cap \cdots \cap q_n$ (最后一个等号是因为4.9)

由 $L2$, $S_n(a)$ 一定稳定。于是 $q_1 \cap \cdots \cap q_n$ 一定稳定, 那么实际上超过 n 的构造过程均得到了 $a = q_1 \cap \cdots \cap q_n \cap a_N$, 并且 a_N 严格升于是只有 $a_n = (1)$, 从而完成了证明。

19. 回想4.E11的证明过程：每个 $\mathfrak{p}$ -准素理想都包含 $S_{\mathfrak{p}}(0)$ 。

如果环 A 满足对于每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，全体准素理想的交为 $S_{\mathfrak{p}}(0)$ 。那么对于一族互异的素理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ ，且它们均不是极小素理想，那么存在一个理想 $\mathfrak{a}$ 使得其从属的素理想正是 $\mathfrak{a}$ 。

证：

对 n 归纳， $n = 1$ 的情况显然。

假定 $n - 1$ 的情况成立。对于 n ，设理想族 $\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n\}$ 中 $\mathfrak{p}_n$ 是极大的。对 $\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-1}\}$ 使用归纳假设，存在一个理想 $\mathfrak{b}$ 具有极小准素分解 $\mathfrak{b} = \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_{n-1}$ ，满足 $r(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}_i$ 。

如果 $\mathfrak{b} \subseteq S_{\mathfrak{p}_n}(0)$ ，设 $\mathfrak{p}$ 是包含在 $\mathfrak{p}_n$ 内的极小素理想，于是 $\mathfrak{b} \subseteq S_{\mathfrak{p}_n}(0) \subseteq S_{\mathfrak{p}}(0)$ 。

两侧取根，则 $\mathfrak{p}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{p}_n = r(\mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n) = r)\mathfrak{b} \subseteq r(S_{\mathfrak{p}}(0)) \xrightarrow{4.E10.2} \mathfrak{p}$

由包容引理 $\mathfrak{p}_i \subseteq \mathfrak{p}$ 对某个 i 成立，由极小性只能有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ 。这和不存在 $\mathfrak{p}_i$ 极小矛盾。

因此 $\mathfrak{b} \not\subseteq S_{\mathfrak{p}_n}(0)$ ，于是存在一个 $\mathfrak{p}_n$ -准素理想 $\mathfrak{q}_n$ 满足 $\mathfrak{b} \not\subseteq \mathfrak{q}_n$ 。那么考虑 $\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n$ 。只需验证这个准素分解是否极小： $r(\mathfrak{q}_i)$ 当然互异，并且 $\mathfrak{q}_n \not\supseteq \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n$ ，并且 $\mathfrak{q}_i \not\supseteq \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_{i-1} \cap \mathfrak{q}_{i+1} \cap \dots \cap \mathfrak{q}_{n-1} \not\supseteq \mathfrak{q}_{i-1} \cap \mathfrak{q}_{i+1} \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n (i < n)$

于是这样的 $\mathfrak{a}$ 满足要求。

模的准素分解

20. 对于给定的 A -模 M ，子模 N 。 N 在 M 中的根定义为 $r_M(N) = \{x \in A \mid x^q M \subseteq N \text{ for some } q > 0\}$

证明： $r_M(N) = r(N : M) = r(\text{Ann}(M/N))$ ，从而说明这是一个理想，并说明它满足1.13中类似性质。

证:

前三个等式成立由定义直接验证即可，性质验证同1.13. 详见下图:

State and prove the formulas for r_M analogous to (1.13).

–i) $P \subseteq N \implies r_M(P) \subseteq r_M(N)$: $x^q M \subseteq P$, implies $x^q M \subseteq N$.
0) $r_B(C^n) = r_B(C)$ for B an A -algebra, C a subalgebra, and $n > 0$: $C^n \subseteq C$, so $r_B(C^n) \subseteq r_B(C)$ by –i).
If $x^q B \subseteq C$, then taking n^{th} powers, and remembering $1 \in B$, gives $x^{qn} B \subseteq C^n$.
i) $r_B(\mathfrak{b}) \supseteq f^{-1}(\mathfrak{b})$, for $f: A \rightarrow B$ an A -algebra and $\mathfrak{b} \subseteq B$: If $b \in \mathfrak{b}$, then $bB = (b) \subseteq \mathfrak{b}$, and by definition if $f(a) = b$, then $aB = f(a)B \subseteq \mathfrak{b}$.
ii) $r(r_M(N)) = r_M(N)$: $x \in r(r_M(N)) \iff \exists p > 0 (x^p \in r_M(N)) \iff \exists p, q > 0 (x^{pq} M \subseteq N) \iff x \in r_M(N)$.
iii) $r_M(N \cap P) = r_M(N) \cap r_M(P)$: If $x^n M \subseteq N \cap P$, then trivially $x^n M \subseteq N$ and $x^n M \subseteq P$.
If $x^n M \subseteq N$ and $x^p M \subseteq P$, then for $q = \max\{n, p\}$ we have $x^q M \subseteq N \cap P$.
iv) $r_M(N) = (1) \iff M = N$: $1 \in r(\text{Ann}(M/N)) \iff 1 \in \text{Ann}(M/N) \iff M/N = 0 \iff M = N$.
v) $r_M(N + P) \supseteq r(r_M(N) + r_M(P))$: By –i), $r_M(N), r_M(P) \subseteq r_M(N + P)$, so $r_M(N) + r_M(P) \subseteq r_M(N + P)$.
Taking radicals and applying ii), $r(r_M(N) + r_M(P)) \subseteq r(r_M(N + P)) = r_M(N + P)$.
The converse is false. Let $A \neq 0$, $M = A \oplus A$ with action $a(b, c) = (ab, ac)$,
 $N = A \oplus (0)$, and $P = (0) \oplus A$,
Then $M = N + P$, so $r_M(N + P) = (1)$, but $r_M(N) = r_M(P) = 0$.

vi) If $\mathfrak{p}$ is prime, $r(\mathfrak{p}^n) = \mathfrak{p}$ for all $n > 0$:

I've no clue how to interpret a power of a module.

I seem to have failed this problem, in that I wasn't sure in all cases what the appropriately analogous formulas were. The ones involving algebras were stretches, brought about by the difficulty of comparing N and $r_M(N)$, one being a submodule of M and the other being an ideal of A .

21. 每个 $x \in A$ 都诱导出一个环的自同态 $\phi_x: m \mapsto xm$ 。称 x 是零因子如果 ϕ_x 不是单射；称 x 是幂零元如果 ϕ_x 这个同态是幂零的。称 M 的子模 Q 是准素的如果 M/Q 中每个零因子都是幂零的。

证明如果 Q 是准素的子模，那么 $(Q : M)$ 是准素的，于是 $r_M(Q)$ 是一个素理想 $\mathfrak{p}$ 。称 Q 在 M 中是 $\mathfrak{p}$ -准素的。

进一步地，验证它具有4.3,4.4中类似结论。

$xyM \subseteq Q$, 则在 M/Q 中 ϕ_{xy} 是零映射。如果 $yM \not\subseteq Q$, 那么 ϕ_y 不是零映射。于是只能有 ϕ_x 有非零的核, 从而是零因子, 于是幂零, 即 $x^n M \subseteq Q$ i.e. $x^n \in (Q : M)$ 。因此 $(Q : M)$ 是准素理想, 接下来的推论是自然的。

4.3,4.4 验证:

Prove the analogues of (4.3) and (4.4).

Lemma 4.3*. *If $Q_i \subseteq M$ ($1 \leq i \leq n$) are $\mathfrak{p}$ -primary, then $Q = \bigcap_{i=1}^n Q_i$ is $\mathfrak{p}$ -primary.*

Since the Q_i are primary, hence not equal to M , their intersection $Q \neq M$. Suppose $x \in A$ is a zero-divisor of M/Q . Then there is some nonzero $m \in M$ such that $xm \in Q = \bigcap Q_i$. Then x is a zero-divisor of each M/Q_i , so by assumption is nilpotent, meaning there is $n_i > 0$ such that $x^{n_i} M \subseteq Q_i$. Taking $n = \max_i n_i$ we see $x^n M \subseteq Q$, so x is nilpotent in M/Q . Thus Q is primary. As for the radical,

$$r(Q : M) = r\left(\bigcap Q_i : M\right) \stackrel{(1.12.iv)}{=} r\left(\bigcap (Q_i : M)\right) \stackrel{(1.13.iii)}{=} \bigcap_i r(Q_i : M) = \bigcap_i \mathfrak{p} = \mathfrak{p}.$$

Lemma 4.4*. *i) Let $N \subseteq M$ be A -modules and $m \in N$. Then $(N : m) = (1)$;*

ii) Let $Q \subseteq M$ be a $\mathfrak{p}$ -primary submodule, and $m \in M$. If $m \notin Q$ then $(Q : m)$ is $\mathfrak{p}$ -primary;

iii) Let $Q \subseteq M$ be a $\mathfrak{p}$ -primary submodule, and $x \in A$. If $x \notin \mathfrak{p}$ then $(Q : x) := \{m \in M : xm \in Q\} = Q$.

i): Since $m \in N$ and N is an A -module, $Am \subseteq N$, so $(N : m) = (1)$.

ii): Suppose $xy \in (Q : m)$, so $xym \in Q$. Suppose $y \notin (Q : m)$, so that $ym \notin Q$. Then x is a zero-divisor in M/Q , so by the assumption Q is primary, there is $n > 0$ such that x^n acts as zero on M/Q . Then $x^n M \subseteq Q$, and in particular $x^n m \in Q$, so $x^n \in (Q : m)$. Thus $(Q : m)$ is primary.

Note that $m \in M$ implies $(Q : M) \subseteq (Q : m)$. Taking radicals, $\mathfrak{p} \subseteq r(Q : m)$. On the other hand assume $x \in r(Q : m)$. Then for some minimal $n > 0$ we have $x^n m \in Q$. Then $x(x^{n-1}\bar{m}) = \bar{0}$ in M/Q , so x is a zero-divisor of M/Q and hence there is $p > 0$ such that $x^p M \subseteq Q$. Then $x \in r_M(Q) = \mathfrak{p}$. Thus $(Q : m)$ is $\mathfrak{p}$ -primary.

iii): Obviously if $m \in Q$ then $xm \in Q$, so $Q \subseteq (Q : x)$. By contraposition, we will suppose $m \in (Q : x) \setminus Q$ and show $x \in \mathfrak{p}$. Well, $xm \in Q$, and $\bar{m} \neq \bar{0}$ in M/Q , so x is a zero-divisor, and for some power $n > 0$ we have $x^n M \subseteq Q$. But then $x \in r_M(Q) = \mathfrak{p}$.

22. (准素分解) 如果子模 N 能够表示成若干准素子模的交 $N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_n$, 称之为准素分解。如果它满足 $r_M(Q_i)$ 互异且 $Q_i \not\supseteq \bigcap_{j \neq i} Q_j$ 则称之为极小准素分解; 证明第一唯一性定理 (4.5) 并且说明从属素理想是 M/N 中从属于 $\bar{0}$ 的素理想。

Theorem 4.5*. Let N be a decomposable submodule of M and let $N = \bigcap_{i=1}^n Q_i$ be a minimal primary decomposition of N . Let $\mathfrak{p}_i = r_M(Q_i)$ ($1 \leq i \leq n$). Then the $\mathfrak{p}_i$ are precisely the prime ideals which occur in the set of ideals $r(N : m)$ ($m \in M$), and hence are independent of the particular decomposition of N .

Set $P_i = \bigcap_{j \neq i} Q_j$. By the assumption of irredundancy, $Q_i \subsetneq P_i$. Let $m \in P_i \setminus Q_i$, and consider the ideal $(N : m) = (P_i \cap Q_i : m) \stackrel{(1.12.iv)}{=} (P_i : m) \cap (Q_i : m)$. By (4.4*.i,ii) of [4.21] above $(P_i : m) = M$ and $(Q_i : m)$ is $\mathfrak{p}_i$ -primary, so $(N : m)$ is $\mathfrak{p}_i$ -primary. Thus each $\mathfrak{p}_i$ is $r(N : m)$ for some $m \in M$.¹¹

Suppose on the other hand that $r(N : m)$ is a prime $\mathfrak{p}$ for some $m \in M$. Note $(N : m) = \left(\bigcap Q_i : m \right) \stackrel{(1.12.iv)}{=} \bigcap (Q_i : m)$, so by (4.4*) above, $\mathfrak{p} = r(N : m) = \bigcap_{m \notin Q_i} \mathfrak{p}_i$. Since the prime $\mathfrak{p}$ is an intersection of some of the $\mathfrak{p}_i$, (1.11.ii) shows $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ for some i .

Show that they are also the prime ideals belonging to 0 in M/N .

Note that for any module $P \subseteq M$ we have $(N : P) = (0 + N : P + N)$. Indeed $xP \subseteq N \iff x(P + N) \subseteq 0 + N = N$. Taking radicals, $r(N : P) = r(0 + N : P + N)$. Specializing to cyclic submodules Am gives $r(N : m) = r(\bar{0} : \bar{m})$, so one is prime just if the other is, and by Theorem 4.5*, the same primes belong to $N \subseteq M$ and $0 \subseteq M/N$.

23. 4.6~4.11的结论在模的情况下仍然成立。

We must convince ourselves we genuinely aren't losing any generality. What we should do is try to lift a primary decomposition, as we know (p. 50) primary ideals are preserved under contraction. So suppose we are given an irredundant primary decomposition $0 = \bigcap Q_i/N$ in M/N (recalling the correspondence (p. 18) between submodules of M/N and submodules of M containing N). Apparently $N = \bigcap Q_i$, and we should show that the Q_i are $r_{M/N}(Q_i/N)$ -primary. Much as in the last part of [4.22], we have $(Q_i/N : M/N) = \{x \in A : xM \subseteq Q_i\} = (Q_i : M)$, and taking radicals gives $r_M(Q_i) = r_{M/N}(Q_i/N)$. Now we must show Q_i is primary. Suppose $x \in A$ is a zero-divisor of M/Q_i . The third isomorphism theorem (2.1.i) gives $M/Q_i \cong (M/N)/(Q_i/N)$, so x is a zero-divisor of the latter, hence nilpotent since Q_i/N is primary, hence nilpotent in M/Q_i since they are isomorphic. Thus Q_i is primary. It is clear that irredundancy is preserved under lifting, as $Q_i/N \supseteq \bigcap_{j \neq i} Q_j/N \iff Q_i \supseteq \bigcap_{j \neq i} Q_j$ by the order-preserving correspondence of p. 18.¹²

Proposition 4.6*. *Let $N \subseteq M$ be a decomposable module. Then any prime ideal $\mathfrak{p} \supseteq r_M(N)$ contains a minimal prime ideal belonging to N , and thus the minimal prime ideals of N are precisely the minimal elements in the set of all prime ideals containing $r_M(N)$.*

Write $N = \bigcap Q_i$, so that ([4.20.iii]) $r_M(N) = \bigcap r_M(Q_i) = \bigcap \mathfrak{p}_i$. If $\mathfrak{p} \supseteq \bigcap \mathfrak{p}_i$, then by (1.11.ii), there is i with $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}_i$, and surely for any $\mathfrak{p}_j \subseteq \mathfrak{p}_i$ we have $\mathfrak{p}_j \subseteq \mathfrak{p}$, so $\mathfrak{p}$ contains an isolated prime ideal of N . In particular, if $\mathfrak{p}$ is minimal over $r_M(N)$, this shows it equals some isolated $\mathfrak{p}_j$.

Proposition 4.7*. *Let $N \subseteq M$ be a decomposable module, let $N = \bigcap_{i=1}^n Q_i$ be a minimal primary decomposition, and let $\mathfrak{p}_i = r_M(Q_i)$. Then*

$$\bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i = \{x \in A : (N : x) \neq N\}.$$

In particular, if $0 \subseteq M$ is decomposable, the set $D \subseteq A$ of zero-divisors of M is the union of the prime ideals belonging to 0 .

Since by [4.22], the set of primes associated to $N \subseteq M$ is the same as that associated to $0 \subseteq M/N$, and for $x \in A$ we have $(N : x) \neq N \subseteq M$ just if $(0 : x) \neq 0 \subseteq M/N$, we can indeed assume $N = 0$.

Then the right-hand side D is the set of x such that there exists $m \neq 0 \in M$ such that $m \in (0 : x)$, or $xm = 0$; with is to say D is the set of zero-divisors of M . Now if $x \in r(D)$, then there is a nonzero $m \in M$ and a least $n > 0$ such that $x^n m = 0$. Then $m' = x^{n-1}m \neq 0$ and $xm' = 0$, so $x \in D$. Thus $D = r(D) = r\left(\bigcup_{m \neq 0} (0 : m)\right) = \bigcup_{m \neq 0} r(0 : m)$. The proof of Theorem 4.5* ([4.22]) shows that each $r(0 : m)$ for $m \neq 0$ is the intersection of some of the $\mathfrak{p}_i$, and each $\mathfrak{p}_i = r(0 : m)$ for some m . Thus $D = \bigcup \mathfrak{p}_i$.

¹¹ I owe this part of the argument to *Multiplicative Theory of Ideals* by Max D. Larsen and Paul Joseph McCarthy. I had initially started reasoning about ideals of the form $((Q : M) : x)$, and was trying to prove that if $N = \bigcap Q_i$ is an irredundant decomposition, then $(N : M) = \bigcap (Q_i : M)$ was likewise.

¹² Note that, on the other hand primary decomposition does not generally survive the quotient process. Indeed, Example 3) on p. 51 shows that the primary ([4.8]) ideal $(x, z)^2$ of $k[x, y, z]$, where k is a field, has image no longer primary in the quotient ring $k[x, y, z]/(xy - z^2)$.

Proposition 4.8*. Let S be a multiplicative submonoid of A , and let $Q \subseteq M$ be a $\mathfrak{p}$ -primary module.

i) If $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$, then $S^{-1}Q = S^{-1}M$.

ii) If $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, then $S^{-1}Q$ is a $S^{-1}\mathfrak{p}$ -primary submodule of $S^{-1}M$, and its preimage (contraction) under the canonical map $M \rightarrow S^{-1}M$ is Q . Hence primary $S^{-1}A$ -submodules of $S^{-1}M$ correspond to primary A -submodules of M .

i): Let $s \in S \cap \mathfrak{p}$. Since $\mathfrak{p} = r_M(Q)$, there is $n > 0$ such that $s^n M \subseteq Q$. Then any element $m/t \in S^{-1}M$ can be written as $s^n m/s^n t \in S^{-1}Q$.

ii): Suppose $x/s \in S^{-1}A$ is a zero-divisor in $S^{-1}M/S^{-1}Q$. Then there is some non-zero $\overline{m/t} \in S^{-1}M/S^{-1}Q$ such that $(x/s)\overline{m/t} = \overline{xm/st} = 0$. Then $xm/st \in S^{-1}Q$, so there is $u \in S$ such that $uxm \in Q \subseteq M$. Then since $\overline{m/t}$ was non-zero, $m \notin Q$, so ux is a zero-divisor of M/Q , hence nilpotent since Q is primary. Then there is $n > 0$ such that $(ux)^n M \subseteq Q$. That means $x^n S^{-1}M = x^n u^n S^{-1}M \subseteq S^{-1}Q$, so x is nilpotent in $S^{-1}M/S^{-1}Q$, meaning $S^{-1}Q$ is primary.

If $x \in \mathfrak{p} = r_M(Q)$, let $n > 0$ be such that $x^n M \subseteq Q$. Then for arbitrary $s \in S$ we have $(x/s)^n S^{-1}M \subseteq S^{-1}Q$, so $x/s \in r(S^{-1}Q : S^{-1}M) = r_{S^{-1}M}(S^{-1}Q)$. On the other hand, if $x/s \in r_{S^{-1}M}(S^{-1}Q)$ then $(x^n/1)S^{-1}M = (x/s)^n S^{-1}M \subseteq S^{-1}Q$ for some $n > 0$. Thus for every $m/t \in S^{-1}M$ we have $x^n m/st \in S^{-1}Q$. This means there is $u \in S$ such that $ux^n m \in Q$. Then ux^n is a zero-divisor of M/Q , so nilpotent in M/Q , and so some power takes M into Q , and $ux^n \in r_M(Q) = \mathfrak{p}$. But then since $\mathfrak{p}$ is prime and $u \notin \mathfrak{p}$ we have $x^n \in \mathfrak{p}$, so $x \in r(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$, and finally $x/s \in S^{-1}\mathfrak{p}$. Therefore $S^{-1}Q$ is $S^{-1}\mathfrak{p}$ -primary.

Now suppose $m \in M$ is such that $m/1 \in S^{-1}Q$. Then there is $s \in S$ such that $sm \in Q$. By (4.7*) above, $\mathfrak{p} = \{x \in A : Q \neq (Q : x)\}$, so $m \in (Q : s) = Q$ as $s \notin \mathfrak{p}$.

Finally, we show that every $S^{-1}A$ -submodule N' of $S^{-1}M$ is an extended module of the form $S^{-1}N$ for some A -submodule $N \subseteq M$. Indeed, let N be the set of $n \in M$ such that $n/1 \in N'$, (which we can also think of as the contraction of N along the canonical map $f: M \rightarrow S^{-1}M$). If $n/s \in N'$, then $n/1 = s(n/s) \in N'$, so $n \in N$ and hence $n/s \in S^{-1}N$. On the other hand $f(N) = f(f^{-1}(N')) \subseteq N'$, so $S^{-1}N \subseteq N'$.

Proposition 4.9*. Let S be a multiplicative submonoid of A and let $N \subseteq M$ be a decomposable ideal. Let $N = \bigcap_{i=1}^n Q_i$ be a minimal primary decomposition of N . Let $\mathfrak{p}_i = r_M(Q_i)$ and suppose the Q_i numbered so that S meets $\mathfrak{p}_{p+1}, \dots, \mathfrak{p}_n$ but not $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_p$. Write $S(N) = \{m \in M : m/1 \in S^{-1}N\}$. Then

$$S^{-1}N = \bigcap_{i=1}^p S^{-1}Q_i, \quad S(N) = \bigcap_{i=1}^p Q_i,$$

and these are minimal primary decompositions.

By (3.4.ii) we have $S^{-1}N = \bigcap_{i=1}^n S^{-1}Q_i$. By (4.8*.i) above, we have $S^{-1}Q_i = S^{-1}M$ for $i > p$, so $S^{-1}N = \bigcap_{i=1}^p S^{-1}Q_i$, and by (4.8*.ii), $S^{-1}Q_i$ is $S^{-1}\mathfrak{p}_i$ -primary for $i \leq p$. Since these $\mathfrak{p}_i$ don't meet S , by (3.11.iv), the $S^{-1}\mathfrak{p}_i$ are distinct primes of $S^{-1}A$. If we had, for some $j \leq p$, that $S^{-1}Q_j \supseteq \bigcap_{i \neq j}^p S^{-1}Q_i$, then taking preimages under $f: M \rightarrow S^{-1}M$ we see that $Q_j \supseteq \bigcap_{i \neq j} Q_i$, contradicting the assumed irredundancy of the Q_i . Thus $S^{-1}N = \bigcap_{i=1}^p S^{-1}Q_i$ is an irredundant primary decomposition of $S^{-1}N$. Taking preimages under $f: M \rightarrow S^{-1}M$,

$$S(N) = f^{-1}(S^{-1}N) = f^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^p S^{-1}Q_i\right) = \bigcap_{i=1}^p f^{-1}(S^{-1}Q_i) = \bigcap_{i=1}^p Q_i$$

by (4.8*.ii) again. This is an irredundant primary decomposition since the decomposition of N is.

Theorem 4.10*. Let $N \subseteq M$ be a decomposable ideal, let $N = \bigcap_{i=1}^n Q_i$ be a minimal primary decomposition of N , let $\mathfrak{p}_i = r_M(Q_i)$, and let $\Sigma = \{\mathfrak{p}_{i_1}, \dots, \mathfrak{p}_{i_m}\}$ be an isolated set of prime ideals of N . Then $\bigcap_{\mathfrak{p}_i \in \Sigma} Q_i$ is independent of the decomposition.

Let $S = A \setminus \bigcup \Sigma$. Then S is a multiplicative submonoid, and for $\mathfrak{p} \in \Sigma$ we have $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, while if $\mathfrak{p} \notin \Sigma$, then since $\mathfrak{p}$ is not contained in an element of Σ by isolation, (1.11.i) shows $\mathfrak{p} \not\subseteq \bigcup \Sigma$, so $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$. Then $\bigcap_{\mathfrak{p}_i \in \Sigma} Q_i = S(N)$ by (4.9*), so this intersection is actually independent of the Q_i chosen.

Corollary 4.11*. The isolated primary components (i.e., the primary components Q_i corresponding to minimal prime ideals $\mathfrak{p}_i$) are uniquely determined by N .

Let $\mathfrak{p}_i$ be an isolated prime of N . Taking $\Sigma = \{\mathfrak{p}_i\}$ and $S_{\mathfrak{p}_i} = A \setminus \mathfrak{p}_i$ in (4.10*) above gives $S_{\mathfrak{p}_i}(N) = Q_i$ independent of the choice of decomposition.

5. 整性相关和赋值

5.0 引言

在代数几何中经常将曲线视作若干直线的覆盖，这和环中元素关于某个子环的整性非常相似，相关的应用将在习题中详细介绍。

5.1 整性相关

给定环 B ，子环 $A, 1 \in A$ 。称 $x \in B$ 是 A 中整的如果它是某个首一 A 上多项式的根。

5.1 (整元的刻画) TFAE:

1. $x \in B$ 在 A 中整
2. $A[x]$ 是有限生成 A -模
3. $A[x]$ 被某个 B 的子环 C 包含，并且 C 是有限生成 A -模。
4. 存在一个忠实 $A[x]$ -模 M ，使得 M 作为 A -模是有限生成的。

Remark. $A[x] = \{f(x) | f \in A[T], T \text{ indeterminate}\}$

证:

1 $\implies$ 2. 显然，设 $f(x) = 0, \deg f = n$ ，那么 $A[x]$ 做为 A -模被 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 生成。

2 $\implies$ 3. 显然，取 $C = A[x]$

3 $\implies$ 4. 取 $M = C$

4 $\implies$ 1. 在2.4中取 ϕ 为 $m \mapsto xm$ ，由于 M 是 $A[x]$ 模，自然有 $xM \subseteq M$ 。于是有 $(x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n)m = 0 \forall m$ ，而忠实保证了 $x^n + \dots + a_n = 0$

5.2 若 $x_i \in B (1 \leq i \leq n)$, 且均在 A 中整, 那么 $A[x_1, \dots, x_n]$ 是有限生成 A -模。

证: 只需回忆 2.16, 有限生成的结合还是有限生成。

5.3 B 中全体 A 中整的元素是一个包含 A 的子环。

证: $x + y, x - y, xy \in A[x, y]$ 由 5.2 是有限生成 A -模, 由 5.1 条件 3 知它们都在 A 上整。

Remark. (代数的整性) 对于环同态 $f: A \rightarrow B$, B 是 A 代数。称 f 整, B 是整的 A -代数, 如果 B 中元素在子环 $f(A)$ 中整。

Remark. (整性闭包, 整闭环) 设 B 中全体 A 中整的元素构成的环是 C , 即 $A \subseteq C \subseteq B$ 。称 C 为 A 在 B 中的整性闭包; 若 $C = A$, 称 A 在 B 中整闭; 若 $C = B$, 称环 B 在 A 上整。

Remark. 有限型+整=有限: 设 $f: A \rightarrow B$, 则 B 是有限生成 A -代数且 B 在 A 上整 $\iff B$ 是有限生成 A -模。

证: $\implies$. 若 B 是有限生成 A -代数, 则 $B = f(A)[x_1, \dots, x_n]$ 。由于 x_i 在 $f(A)$ 上整, 由 5.2 立刻有 $f(A)[x_1, \dots, x_n]$ 是有限生成 $f(A)$ -模, 于是是有限生成 A -模。

$\impliedby$. 若 B 是有限生成 A -模, 那它自然是有限生成代数。那么

$B = f(A) \langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\text{mod}} \subseteq f(A)[x_1, \dots, x_n] \subseteq B$, 于是任何 $b \in B$ 都有 $f(A)[b] \subseteq B$ 为有限生成 A -模, 于是证明了整性。

5.4 (整性相关的传递性) $A \subseteq B \subseteq C$, 如果 B 的元素在 A 中整, C 的元素在 B 中整, 那么 C 的元素在 A 中整。

证: 设 $c \in C$ 满足 $c^n + b_1 c^{n-1} + \dots + b_n = 0$, 且 $B' = A[b_1, \dots, b_n]$ 是有限生成 A -模; 又由于 c 在 B' 中整, 于是 $B'[c]$ 有限生成。由 2.16, $B'[c]$ 是有限生成的 A -模, 于是 c 在 A 中整。

5.5 $A \subseteq B$, C 是 A 在 B 中的整性闭包, 则 C 在 B 中整闭。

证: x 在 C 中整, 于是由5.4, x 在 A 中整, 于是 $x \in C$ 。

5.6 (整性在商和分式化下保持)

$A \subseteq B$, 环 B 在环 A 上整

1. $\mathfrak{b}$ 是 B 的理想; $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = A \cap \mathfrak{b}$, 那么 $B/\mathfrak{b}$ 在 $A/\mathfrak{a}$ 上整。

2. S 是 A 的乘性子集, 那么 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整。

证:

直接验证即可。

5.2 Cohen-Seidenberg 定理

接下来将要研究素理想的升降链在整扩张中的表现, 主要结果被称为Cohen-Seidenberg的上升定理和下降定理。

5.2.1 上升定理

5.7 $A \subseteq B$ 是整环, B 在 A 上整。那么 B 是域 $\iff A$ 是域。

证:

$\implies$. 对 $y \in B, y \neq 0, y^n + a_1y^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ 是极小首一多项式。

由于整环, $y \neq 0$ 则极小多项式中 $a_n \neq 0$

于是 $y(y^{n-1} + a_1y^{n-2} + \cdots + a_{n-1}) = -a_n$, 即
 $y(-a_n^{-1}y^{n-1} - a_n^{-1}a_1y^{n-2} - \cdots - a_n^{-1}a_{n-1}) = 1$

$\Leftarrow$. 对 $x \in A$, 设 $x^{-1} \in B$ 使得 $xx^{-1} = 1$. 于是 x^{-1} 在 A 上整:

$x^{-n} + a_1x^{-n+1} + \cdots + a_n = 0$, 两侧乘上 x^{n-1} 有 $x^{-1} = -(a_1 + \cdots + a_nx^{n-1})$, 于是 $x^{-1} \in A$.

5.8 $A \subseteq B$, 环 B 在环 A 上整; q 是 B 的素理想, $p = q^c = p \cap A$ 是拉回. 则 q 极大 $\iff p$ 极大.

证: 5.6和5.7的直接推论。

5.9 $A \subseteq B$, 环 B 在环 A 上整; q, q' 是 B 的素理想, $q \subseteq q'$ 且 $q^c = q'^c = p$, 则 $q = q'$

证: 记 $S = A - p$, 由 5.6 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整, 设 m 是 p 在 $S^{-1}A$ 中的扩张; n, n' 是 q, q' 在 $S^{-1}B$ 中的扩张。

注意到 m 在 $S^{-1}A$ 中是极大的; 并且考虑嵌入 $S^{-1}A \hookrightarrow S^{-1}B$: n, n' ; 在这个嵌入下的局限均为 m . 由 5.6, n, n' 都是极大的, 但另一方面 $n \subseteq n'$ 于是只能有 $n = n'$. 拉回至 B 中即有 $q = q'$.

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_p & \longrightarrow & (A-p)^{-1}B \end{array}$$

5.10 $A \subseteq B$, 环 B 在环 A 上整; p 是 A 的素理想. 存在 B 的素理想 q 使得 $q \cap A = p$

同样在交换图 $\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_p & \longrightarrow & (A-p)^{-1}B \end{array}$ 中考虑 $(A-p)^{-1}B$ 的极大理想。

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_p & \longrightarrow & (A-p)^{-1}B \end{array}$$

由5.8，它拉回至 $A_{\mathfrak{p}}$ 是极大的。于是拉回至 A 为 $\mathfrak{p}$ 。因此取 $\mathfrak{q}$ 为 $(A - \mathfrak{p})^{-1}B$ 中的极大理想拉回至 B 内的理想即可。

5.11 (上升定理) $A \subseteq B$ ，环 B 在环 A 上整。环 A 中 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \cdots \mathfrak{p}_n$ 是素理想上升链，环 B 中也有一个素理想上升链 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \cdots \mathfrak{q}_m$ ($m < n$)，并且 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ 。

那么 B 中的素理想链可以扩充为 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{q}_n$ ，使得 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ 。

证：由归纳只需证明 $m = 1, n = 2$ 的情况。

取 $A' = A/\mathfrak{p}_1; B' = B/\mathfrak{q}_1$ ，那么依然有 $A' \subseteq B'$ 。由5.6 B' 在 A' 上整，由5.10存在 $\mathfrak{q}'_2$ 是 B' 的素理想，并且 $\mathfrak{q}'_2 \cap A' = \mathfrak{p}'_2$ ，那么 $\mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2$ 。从而完成证明。

5.2.2 整闭环, 下降定理

首先指出不仅仅是整性(5.6)，整性闭包也在分式化下保持。

5.12 $A \subseteq B$ ， C 是 A 在 B 中的整性闭包。 S 是 A 的乘性子集，则 $S^{-1}C$ 是 $S^{-1}A$ 在 $S^{-1}B$ 中的整性闭包。

证：首先 $S^{-1}C$ 在 $S^{-1}A$ 上整是显然的。如果 $b/s \in S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整，即：

$$(b/s)^n + (a_1/s_1)(b/s)^{n-1} + \cdots + (a_n/s_n) = 0$$

两侧同时乘以 $(ss_1 \cdots s_n)^n$ ，于是 $bs_1 \cdots s_n$ 在环 A 上整，从而属于 C ，于是 $b/s = (bs_1 \cdots s_n)/(ss_1 \cdots s_n) \in S^{-1}C$

Def. (整闭环) 称一个整环是整闭的，如果它在其分式域中是整闭的。

Prop. UFD都是是整闭环，于是特别地 $\mathbb{Z}$ 和 $k[x_1, \cdots, x_n]$ 是整的。

证：若 r/s 整， r, s 没有共同因子。则 $r^n + a_1 r^{n-1} s + \cdots + a_n s^n = 0$ ，于是 $s|r^n$ ，故 s 是单位，于是 r/s 在环中。

5.13（整闭性是局部性质）给定整环 A ，以下三者等价：

1. A 整闭；2. A_p 对每个素理想 p 整闭；3. A_m 对每个极大理想 m 整闭。

证：

设 K 是 A 的分式域， C 是 A 在 K 中的整性闭包，则 A 整闭当且仅当嵌入映射 $f: A \rightarrow C$ 是满的。

同样由5.12， $A_{p(m)}$ 是整闭的 $\iff f_{p(m)}$ 是满射。由于局部化操作是正合的二者等价性立刻得证。

Def.（理想上的整元） $A \subseteq B$ 称为 A 中的理想 $\mathfrak{a}$ 上的整元素，如果它是某个首一 $\mathfrak{a}$ 系数的多项式的根。同样也可以定义理想上的整性闭包。

5.14（理想上整性闭包的刻画） C 是 A 在 B 中的整性闭包， $\mathfrak{a}^e$ 记为 $\mathfrak{a}$ 在 C 中的扩张。那么 $\mathfrak{a}$ 在 B 中的整性闭包是 $\mathfrak{a}^e$ 的根理想。

证：

设 x 在 $\mathfrak{a}$ 上整，即 $x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ ， $a_i \in \mathfrak{a}$ 。于是 x 也在 A 上整，即 $x \in C$ ，故 $x^n \in \mathfrak{a}^e$ ，进而 $x \in r(\mathfrak{a}^e)$

反过来，如果 $x \in r(\mathfrak{a}^e)$ ， $x^n = \sum a_i x_i$ ，其中 $a_i \in \mathfrak{a}, x_i \in C$ 。于是 $M = A[x_1, \cdots, x_n]$ 有限生成，进而在2.4中取 ϕ 为乘以 x^n 有 $x^n M \subseteq \mathfrak{a}M$ ，于是 x^n 在 $\mathfrak{a}$ 上整。

5.15 $A \subseteq B$ 是整环， A 整闭且 $x \in B$ 在 A 的某个理想 $\mathfrak{a}$ 上整。那么 x 是 A 的分式域 K 上的代数元，并设极小多项式为 $t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_n$ ，则系数 $a_1, \cdots, a_n \in r(\mathfrak{a})$

证：

x 是 K 上代数元是显然的。

考虑极小多项式的分裂域 L 。那么极小多项式在 L 中的根 $x_1, \dots, x_n$ 均在理想 $\mathfrak{a}$ 上整，于是均在 A 中，于是由5.14均在 $r(\mathfrak{a})$ 中，于是系数由Vieta定理都在 $r(\mathfrak{a})$ 中、

5.16 (下降定理) $A \subseteq B$ 是整环， A 整闭， B 在 A 上整。环 A 中 $\mathfrak{p}_1 \supseteq \dots \mathfrak{p}_n$ 是素理想下降链，环 B 中也有一个素理想下降链 $\mathfrak{q}_1 \supseteq \dots \mathfrak{q}_m (m < n)$ ，并且 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ 。

那么 B 中的素理想链可以扩充为 $\mathfrak{q}_1 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{q}_n$ ，使得 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ 。

证：

同样我们可以只考虑 $m = 1, n = 2$ 的情况。

只需说明 $\mathfrak{p}_2$ 是某个 $B_{\mathfrak{q}_1}$ 到 A 的拉回：其中映射定义为 $A \hookrightarrow B \hookrightarrow B_{\mathfrak{q}_1}$ ，即需要满足 $\mathfrak{p}_2 B_{\mathfrak{q}_1} \cap A = \mathfrak{p}_2$ 。

每个 $\mathfrak{p}_2 B_{\mathfrak{q}_1}$ 的元素 x 具有形式 y/s ， $y \in \mathfrak{p}_2 B, s \in B - \mathfrak{q}_1$ 。由5.14， y 是 $\mathfrak{p}_2$ 上的整元，于是其在 A 的分式域 K 上有极小多项式 $y^r + u_1 y^{r-1} + \dots + u_r = 0$ ，其中 $u_i \in \mathfrak{p}_2$ 。

现在设 $x \in \mathfrak{p}_2 B_{\mathfrak{q}_1} \cap A$ ， $s = yx^{-1}$ ，其中 $x^{-1} \in K$ ，于是 s 在 K 中的极小多项式是前述多项式除以 x^r ，设为 $s^r + v_1 s^{r-1} + \dots + v_r = 0$ ， $v_i = u_i/x^i$ 。

即 $x^i v_i = u_i \in \mathfrak{p}_2$ 。

另一方面 s 在 A 上整，于是由5.15（取 $\mathfrak{a} = A$ ）知 $v_i \in A$ 。如果 $x \notin \mathfrak{p}_2$ ，那么由 $x^i v_i \in \mathfrak{p}_2$ 知 $v_i \in \mathfrak{p}_2$ ，于是 $s^r \in \mathfrak{p}_2 B \subseteq \mathfrak{p}_1 B \subseteq \mathfrak{q}_1$ 。从而 $s \in \mathfrak{q}_1$ ，矛盾。

于是 $x \in \mathfrak{p}_2$ ，即 $\mathfrak{p}_2 B_{\mathfrak{q}_1} \cap A = \mathfrak{p}_2$ 。

5.17 设 A 是整闭环， K 是分式域， L 是 K 的有限可分扩张， B 是 A 在 L 中的整性闭包。那么存在 L 的一组 $(K-)$ 基 $v_1, \dots, v_n$ 使得 $B \subseteq \sum A v_i$ 。

证：对于 L 中元素 v ， v 是 K 上代数元且满足 $a_0 v^r + a_1 v^{r-1} + \dots + a_n = 0, a_i \in A$

两侧乘以 a_0^{r-1} ，于是 $a_0 v = u$ 自然在 A 上整，于是 $u \in B$ 。因此对于任何一组基乘上对应的 A 中元素得到 $u_1, \dots, u_n \in B$ ，同时也是一组基。

由于 L/K 是可分扩张，于是 $(x, y) \mapsto T(xy)$ 是非退化的双线性型，于是有一组对偶基 $v_1, \dots, v_n$ ，满足 $T(u_i v_j) = \delta_{ij}$

对于 $x \in B$ ， $x = \sum x_j v_j$ 。而 $u_i \in B$ 说明 $x u_i \in B$ ，于是由5.15 $T(x u_i) \in A$ 。

然而 $T(x u_i) = \sum_j T(x_j u_i v_j) = \sum_j x_j \delta_{ij} = x_i$ ，即 $x_i \in A$ 。故 $B \subseteq \sum A v_i$ 。

5.3 赋值环

Def. (赋值环) B 是整环， K 是它的分式域。称 B 是 K 的赋值环如果对于每个非零的 $x \in K$ ， x, x^{-1} 至少有一个在 B 中。

5.18 对于赋值环 B ，以下性质成立：

1. B 是局部环。
2. 如果 $B \subseteq B' \subseteq K$ ，则 B' 也是 K 的赋值环。
3. B 是整闭的。

证：

5.18.1

取 $\mathfrak{m}$ 为全体 B 中的非零元构成的集合，于是 $x \in \mathfrak{m} \iff x = 0 \text{ or } x^{-1} \notin B$ 。

对于 $ax, x \neq 0$ ，若 $(ax)^{-1} \in B$ ，那么 $x^{-1} = a(ax)^{-1} \in B$ ，矛盾。

对于 $x, y \in \mathfrak{m}$ ，无妨 $x, y \neq 0$ 。

那么 $xy^{-1} \in B$; $x^{-1}y \in B$ 至少有一个成立。若前者成立,
 $x + y = (1 + xy^{-1})y \in B\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$, 另外一种情况同理说明成立。

5.18.2

显然。

5.18.3

若 $x \in K$ 在环 B 上整, $x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n = 0$ 。如果 $x \in B$ 则已证, 否则 $x^{-1} \in B$,
 $x = -b_1 - b_2x^{-1} - \cdots - b_nx^{1-n}$ 。

指定域中赋值环的构造

设 K 是域, Ω 是代数闭域。设 Σ 是 (A, f) 构成的组, 其中 A 是 K 的子环, f 是 A 到 Ω 的同态。
 定义偏序 $(A, f) \leq (A', f') \iff A \subseteq A' \text{ and } f'|_A = f$, 于是应用Zorn引理立刻有 Σ 有极大元。

设 (B, g) 是极大元, 接下来的目标是证明 B 是 K 的赋值环。

Step 1.

5.19 B 是局部环且 $\mathfrak{m} = \ker g$ 是其极大理想。

证: 由于 $g(B)$ 是域 Ω 的子环, 自然是整环。从而 $\mathfrak{m} = \ker g$ 是素理想。将同态 $g: B \rightarrow \Omega$ 扩展为同态 $\tilde{g}: B_{\mathfrak{m}} \rightarrow \Omega: \tilde{g}(b/s) = g(b)/g(s)$: 注意 $g(s)$ 永远不是0。

由极大性有 $B = B_{\mathfrak{m}}$, 于是得证。

Step2.

5.20 设 x 是 K 的非零元, $B[x]$ 是 K 的子环, 由 x 在 B 上生成。记 $\mathfrak{m}[x]$ 为 $\mathfrak{m}$ 在同态 $B \rightarrow B[x]$ 下的扩张, 那么 $\mathfrak{m}[x] \neq B[x]$ 和 $\mathfrak{m}[x^{-1}] \neq B[x^{-1}]$ 至少有一成立。

证: 若否, $\mathfrak{m}[x] = B[x], \mathfrak{m}[x^{-1}] = B[x^{-1}]$

由条件, x 满足:

$$\begin{aligned} u_0 + u_1x + \cdots + u_mx^m &= 1 \quad (u_i \in \mathfrak{m}) \\ v_0 + v_1x^{-1} + \cdots + v_nx^{-n} &= 1 \quad (v_i \in \mathfrak{m}) \end{aligned}$$

假定在上述两式中 m, n 次数尽量小, 并且 $m \geq n$ 。那么 $v_1x^{n-1} + \cdots + v_n = (1 - v_0)x^n$

由于 $v_0 \in \mathfrak{m}$, 由 5.19, $1 - v_0$ 是单位。于是 $x^n = w_1x^{n-1} + \cdots + w_n \quad w_i \in \mathfrak{m}$

于是 $x^m = w_1x^{m-1} + \cdots + w_nx^{m-n}$, 那么将 x^m 代入 $u_0 + u_1x + \cdots + u_mx^m = 1 \quad (u_i \in \mathfrak{m})$, 得到次数更低者, 矛盾。

Step 3.

5.21 对这个极大元素 (B, g) , B 是域 K 的赋值环。

证:

对于任意 $x \in K, x \neq 0$, 由 5.20 可以假设 $\mathfrak{m}[x] \neq B[x]$, 于是它必然被 $B[x]$ 的某个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 包含。拉回至 B 有 $\mathfrak{m}' \cap B = \mathfrak{m}$, 于是嵌入 $B \hookrightarrow B[x]$ 诱导了域嵌入 $B/\mathfrak{m} \hookrightarrow B[x]/\mathfrak{m}'$ 。记这两个域分别为 k, k' , 于是 $k' = k[\bar{x}]$, 其中 $\bar{x}$ 指 x 在 k' 中的像。于是扩域 $[k', k]$ 是有限代数扩张。

同态 g 诱导出了嵌入 $\bar{g}: k \rightarrow \Omega$, 由于 Ω 是代数闭域, $\bar{g}$ 可以扩展为 $\bar{g}': k' \rightarrow \Omega$ 。再复合上自然同态 $B' \rightarrow k'$, 我们得到了 $(B, B' \rightarrow k' \rightarrow \Omega)$ 。于是由极大性有 $B = B', x \in B$ 。

Corollary. 5.22

设 A 是域 K 的子环, A 在 K 中的整性闭包 $\bar{A}$ 是全体包含 A 赋值环的交。

证:

由于赋值环是整闭的, 于是整性闭包当然被赋值环的交包含。

反过来如果 $x \notin \bar{A}$, 那么 $x \notin A' = A[x^{-1}]$, 即在 A' 中 x^{-1} 不是单位, 于是被极大理想 $\mathfrak{m}'$ 包含。设 Ω 是 $k' = A'/\mathfrak{m}'$ 的代数闭包, 那么将同态 $A' \rightarrow k'$ 限制在 A 上得到了同态 $A \rightarrow \Omega$ 。由 5.21, 存在某个包含 A 的赋值环 (B, g) , 其中后者是映射 $A \rightarrow \Omega$ 的延拓。由于 x^{-1} 在这个映射下变为 0, 那么 $x \notin B$ 。从而不属于赋值环的交。

Zariski引理

5.23 设 $A \subseteq B$ 是整环, B 在 A 上有限生成。设 v 是 B 中的非零元素, 那么存在 $u \neq 0, u \in A$, 满足以下性质:

每个 A 到一个代数闭域 Ω 上满足 $f(u) \neq 0$ 的同态 f 都可以被延拓为 B 到 Ω 的同态 g , 且 $g(v) \neq 0$

证:

由归纳, 只需考虑 B 由一个元素 x 在 A 上生成的情况。

A. x 在 A 的分式域上是超越元, 设 $v = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, 取 $u = a_0 \neq 0$

对于 $f: A \rightarrow \Omega, f(u) \neq 0$, 存在 $\xi \in \Omega$, 使得 $f(a_0)\xi^n + \cdots + f(a_n) \neq 0$ (否则注意到使得方程为0的根只有有限个, 而代数闭域不是有限域), 那么定义 $g: B \rightarrow \Omega$:

$g(a) = f(a), a \in A \quad g(x) = \xi$, 满足要求。

B. x 在 A 的分式域上是代数元。同时 v^{-1} 也是 A 的分式域上的代数元 (因为 v 可表示为 x 在 A 上的多项式值), 故有如下方程式:

$a_0x^m + \cdots + a_mx = 0 \quad a'_0v^{-n} + \cdots + a'_nv = 0$, 取 $u = a_0a'_0$, 对于任何 $f: A \rightarrow \Omega, f(u) \neq 0$:

首先延拓至 $f_1: A[u^{-1}] \rightarrow \Omega, f_1(u^{-1}) = f(u)^{-1}$, 于是由5.21存在一个包含 $A[u^{-1}]$ 的赋值环 C , 以及一个延拓的同态 $h: C \rightarrow \Omega$ 。

由于 x 在 $A[u^{-1}]$ 上整, 于是 $x \in C$ (5.22), 于是 $B \subseteq C$ 。特殊地 $v \in B \subseteq C$

另一方面 v^{-1} 在 $A[u^{-1}]$ 上整 (观察上文中第二个方程式), 于是又一次的有 $v^{-1} \in C$, 即 v 在 C 中是单位, 于是 $h(v) \neq 0$ 。现在将 h 从 C 限制到 B 即可。

5.24 (Zariski Lemma) 设 k 是域, B 是有限生成 k 代数。如果 B 是域那么它是 k 的有限代数扩张。

证：在5.23中取 $A = k$, $v = 1$, $\Omega = \bar{k}$, 可以验证此时同态 f, g 都是嵌入。于是 $k \subseteq B \subseteq \bar{k}$, 又由有限生成自然说明结论。

注意：5.24(Zariski Lemma)能够推出Weak Hilbert Nullstellensatz.

5.25 (Hilbert Nullstellensatz Weak Form) $\mathfrak{m}$ 是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的极大理想, k 代数闭, 则 $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m} \cong k$

证：记 $B = k[x_1, \dots, x_n]$, 其中 k 代数闭, $\mathfrak{m}$ 为 B 的极大理想。

域 $B/\mathfrak{m}$ 是 k 的扩张：注意复合映射 $k \rightarrow B \rightarrow B/\mathfrak{m}$ 不是零映射, 于是只能是嵌入。那么自然是有限生成 k 代数。

于是 $B/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限代数扩张, 但 $k = \bar{k}$, 只有 $B/\mathfrak{m} = k$ 。

5.25 Cor. 更进一步地极大理想一定形如 $\langle x_1 - k_1, \dots, x_n - k_n \rangle$ 。

证：首先注意到上述形式是极大理想, 因为它是映射 $k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow k : f \mapsto f(k_1, \dots, k_n)$ 的核：对 n 归纳。然后对 $x_1 - k_1$ 做带余除法即可。

反过来对于任何一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m} \cong k$, 设 $x_1, \dots, x_n$ 的像分别为 $k_1, \dots, k_n$, 于是 $\mathfrak{m} = \ker \supseteq \langle x_1 - k_1, \dots, x_n - k_n \rangle$, 而后者已然是极大理想, 于是只有 $\mathfrak{m} = \langle x_1 - k_1, \dots, x_n - k_n \rangle$

5.4(E)

1. 设 $f : A \rightarrow B$ 是整的环同态, i.e. B 在 $f(A)$ 上整。证明 $f^* : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是闭映射。

证：

f 可以分解为 $A \rightarrow f(A) \rightarrow B$, 其中前一个箭头诱导的是到 $V(\ker)$ 同胚, 必然是闭映射。

于是只需研究第二个箭头, 因此不妨 $A \subseteq B$, 且 B 在 A 上整。此时每个 A 中的素理想 $\mathfrak{p}$ 都具有形式 $A \cap \mathfrak{q}$, 同时每个 B 中素理想 $\mathfrak{q}$ 都诱导出 A 中素理想 $A \cap \mathfrak{q}$, 于是自然有 $V(\mathfrak{q})$ 在 f^* 下的像为 $V(\mathfrak{q}^c)$

即 $V(\mathfrak{q})$ 的像也形如 $V(\mathfrak{r})$ ，自然说明了闭映射。

2. A 是 B 的子环， B 在 A 上整， $f: A \rightarrow \Omega$ 是 A 到某个代数闭域 Ω 的环同态，证明 f 可以被延拓为 $B \rightarrow \Omega$ 的环同态。

证：

f 可以分解为 $A \rightarrow A/\mathfrak{p} \rightarrow \Omega$ ，其中 $\mathfrak{p} = \ker f = (0)^c$ 自然是素理想。

那么存在 B 中素理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ ，由5.6.1， $B/\mathfrak{q}$ 在 $A/\mathfrak{p}$ 上整。

因此只需说明 $A \subseteq B$ 且 A, B 均为整环时，单环同态 $f: A \rightarrow \Omega$ 可以被延拓为环同态 $B \rightarrow \Omega$ 。

如同在5.3中做的那样，考虑这样的元素对 (C, σ) ，其中 $A \subseteq C \subseteq B$ ， $\sigma: C \rightarrow \Omega$ 并且 $\sigma|_A = f$ 。利用Zorn引理知极大元素存在，设为 (C, σ) 。

若 $C \neq B$ ，设 $b \in B - C$ 。 b 在 A 上整，自然在 C 上整。设 $p(x) \in C[x]$ 满足 $p(b) = 0$

注意 $\sigma p(x) = \sum \sigma(c_i)x^i$ 在 Ω 中必定有一根，取为 z 。那么 $C[b] \rightarrow \Omega: b \mapsto z$ 满足条件。于是与极大性矛盾，进而只有 $B = C$ 。

3. $f: B \rightarrow B'$ 是 A -代数同态， C 是 A -代数。如果 f 是整同态，那么 $f \otimes_A 1: B \otimes_A C \rightarrow B' \otimes_A C$ 是整同态。

证：

由于整元素构成环，只需验证生成元 $b' \otimes_A c$ 是整的。

设 b' 满足 $b'^n + f(b_{n-1})b'^{n-1} + \cdots + f(b_0) = 0$ ，于是 $(b' \otimes c)^n + (f(b_{n-1}) \otimes c)(b' \otimes c)^{n-1} + \cdots + (f(b_0) \otimes c^n) \cdot (b' \otimes c)^0 = 0$

从而得证。

4. 设 A 是 B 的子环, 并且 B 在 A 上整。设 $\mathfrak{n}$ 是 B 的极大理想, $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A$ 也是 A 的极大理想。
(Recall 5.10), 那么 $B_{\mathfrak{n}}$ 一定在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上整吗?

不一定。取 $B = k[x]$ 的子环 $A = k[x^2 - 1]$ (其中 k 为域),
 $\mathfrak{n} = (x - 1), \mathfrak{m} = (x^2 - 1) \cap A$ 。

如果 $B_{\mathfrak{n}}$ 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上整, 考虑元素 $1/(x + 1)$ 。

那么有如下成立: $1/(x + 1)^n + \sum_{m=0}^{n-1} g_m(x^2 - 1)/[k_m(x^2 - 1)] \cdot [1/(x + 1)^m] = 0$

其中 $k_m(0) \neq 0$, 那么两侧同乘 $(x + 1)^{n-1}$ 后令 $x = -1$ 即得到矛盾。

5. 环 $A \subseteq B$, B 在 A 上整。

5.1 如果 $x \in A$ 在 B 中是单位, 那么 x 在 A 中是单位。

5.2 $J(A) = J(B)^c$

证:

5.1 这和定理5.7中的 $\Leftarrow$ 方向证明完全相同。

5.2 即证 $J(A) = J(B) \cap A$

考虑5.8, 以及 $J(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ maximal}} \mathfrak{m}$, 命题显然。

6. 设 $B_1, \dots, B_n$ 是整的 A -代数, 那么 $\prod_{i=1}^n B_i$ 是整的 A -代数。

证: 由归纳只需证明 $n = 2$ 的情况。

对于 $(b_1, b_2) \in B_1 \times B_2$ 。设 $f, g \in A[x]$ 是两个首一多项式, 且它们分别将 b_1, b_2 零化。那么考虑 $(fg)(b_1, b_2) = (f(b_1)g(b_1), f(b_2)g(b_2)) = 0$, fg 仍然是 $A[x]$ 中的首一多项式, 于是这就说明了 (b_1, b_2) 是在 A 上整的, 进而 $B_1 \times B_2$ 是整的 A -代数。

7. 设 A 是 B 的子环, $B - A$ 在乘法下封闭。证明 A 在 B 中是整闭的。

证:

若否, 设 $b \in B - A$ 且 b 在 A 上整。

即 $b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_{n-1} b + a_n = 0$, 于是 $-a_n = b(b^{n-1} + \cdots + a_{n-1})$ 。于是只有 $b^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \in A$ 。

同样地有 $b(b^{n-2} + \cdots + a_{n-2}) \in A$, 反复进行此操作得到 $b + a_1 \in A$, 矛盾。

故 A 整闭。

整性闭包在多项式环上保持

8.

8.1 设 A 是整环 B 的子环, C 是 A 在 B 中的整性闭包。首一多项式 $f, g \in B[x]$ 满足 $fg \in C[x]$ 。则 $f, g \in C[x]$

8.2 将整环的条件去掉后证明此命题。

证:

8.1 考虑包含 B (或准确地说 $\text{Frac}(B)$) 且 f, g 在其上分裂的域。设此时 $f = \prod (x - f_i), g = \prod (x - g_i)$, 于是 f_i, g_i 均为 fg 的根, 于是在 C 上整。从而 f, g 的系数均在 C 上整, 进而均属于 C , 即 $f, g \in C[x]$

8.2

此时仍然只需证明使多项式分裂的环的存在性:

对于 $f(x)$, 考虑扩环 $B[x]/(f(x))$, 那么在其中 $T - x | f(T)$, 考虑 $f(T)/(T - x)$ 继续扩环即可。

9. 设 A 是 B 的子环, C 是 A 在 B 中的整性闭包。证明 $C[x]$ 是 $A[x]$ 在 $B[x]$ 中的整性闭包。

证:

若 $f \in B[x]$ 在 $A[x]$ 上整。即 $f^m + g_1 f^{m-1} + \cdots + g_m = 0$ 对某些 $g_i \in A[x]$ 成立。

对 $r > m$, 取 $f_1 = f - x^r$, 即有 $f_1^m + h_1 f_1^{m-1} + \cdots + h_m = 0$, 其中 $h_m = (x^r)^m + g_1 (x^r)^{m-1} + \cdots \in A[x]$.

那么对 $-f_1, f_1^{m-1} + h_1 f_1^{m-2} + \cdots + h_{m-1}$ 应用8, 当然有它们的乘积 (h_m) 属于 $A[x]$, 进而属于 $C[x]$, 于是 f_1 属于 $C[x]$ 。而 x^r 当然属于 $C[x]$, 于是 $f \in C[x]$ 。

反过来由于 x 在 $A[x]$ 上整, C 在 $A[x]$ 上整, 于是 $C[x]$ 在 $A[x]$ 上整。

环同态的上升性质和下降性质

10. 称环同态 $f: A \rightarrow B$ 具有上升(下降)性质如果对于扩环 $f(A) \subseteq B$ 上升(下降)定理成立。

取拉回映射 $f^*: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$

10.1 对于以下三个条件

1a. f^* 是闭映射; 1b. f 具有上升性质; 1c. 对于任何 B 中素理想 $q, p = q^c$, 那么映射 $\text{Spec}(B/q) \rightarrow \text{Spec}(A/p)$ 是满的。

证明: $a \implies b \iff c$,

10.2 对于以下三个条件

2a. f^* 是开映射; 2b. f 具有下降性质; 2c. 对于任何 B 中素理想 $q, p = q^c$, 那么 $f^*: \text{Spec}(B_q) \rightarrow \text{Spec}(A_p)$ 是满的。

证:

$1b \iff 1c$ 是显然的。因为这相当于要求对每个包含 $\mathfrak{p}_1$ 的素理想 $\mathfrak{p}_2$ ，都能够找到一个包含 $\mathfrak{q}_1$ 的素理想，并且满足其在拉回映射的像下为 $\mathfrak{p}_2$ ，而这正是 $\text{Spec}(B/\mathfrak{q}) \rightarrow \text{Spec}(A/\mathfrak{p})$

$1a \implies 1c$. 考虑 $V(\mathfrak{q})$ 的像，由于 f^* 闭映射，其像集一定具有 $V(\mathfrak{a})$ 的形式。首先显然有 $V(\mathfrak{a}) \subseteq V(\mathfrak{p})$ ，但另一方面由于 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的像， $\mathfrak{p} \subseteq V(\mathfrak{a})$ 。于是只能有 $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{a})$ ，即 $\text{Im} V(\mathfrak{q}) = V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{p})$ ，从而证明了 $1c$ 成立。

10.2

$2b \iff 2c$ 成立原因同前。

$2a \implies 2c$.

注意：这里完全不和1中情况对偶。

首先由于Zariski的拓扑中开集具有下降性质，即 $\mathfrak{p} \in U, \mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p} \implies \mathfrak{p}' \in U$. (考虑补集即可)

由于 $B_{\mathfrak{q}}$ 是全体 B_t 环的正向极限， $t \in B - \mathfrak{q}$ 。于是由3.E26

$f^*(\text{Spec}(B_{\mathfrak{q}})) = \cap f^*(\text{Spec}(B_t)) = \cap f^*(Y_t)$ 。其中 Y_t 是包含 $\mathfrak{q}$ 的开集，于是 $f^*(Y_t)$ 是包含 $\mathfrak{p}$ 的开集。对于每个 $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}$ ，都有 $\mathfrak{p}' \subseteq f^*(Y_t)$ ，从而 $f^*(\text{Spec}(B_{\mathfrak{q}})) = \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$

11. 设 $f: A \rightarrow B$ 是平坦环同态，那么 f 有下降性质。

(Recall. 平坦环同态即 B 作为 A -模是平坦的)

证：由3.E18和5.E10显然。

12. 设 G 是环 A 的自同构群的有限子群。记 A^G 为 A 中全体 G -不变元素构成的子环（可以迅速地验证它的确是子环），那么 A 在 A^G 上整。

设 S 是 A 的乘性子集，且满足 $\sigma(S) \subseteq S, \forall \sigma \in G$ ，并记 $S^G = S \cap A^G$ 。证明 G 在 A 上的作用可以延拓到 $S^{-1}A$ 上，并且 $(S^G)^{-1}A^G \cong (S^{-1}A)^G$

证：

12.1 A 在 A^G 上整：对于任何 $x \in A$ ，注意到 x 是多项式 $f(t) = \prod_{\sigma \in G} (t - \sigma(x))$ 的解，并且由于系数为初等对称多项式，自然是 G 不变的。

12.2 对于 $\sigma \in G$ ，取 $\sigma(a/s) = \sigma(a)/\sigma(s)$ 即可。

良定义性：若 $a/s = b/t, s'(at - bs) = 0$ ，则 $\sigma(s')[\sigma(a)\sigma(t) - \sigma(b)\sigma(s)] = 0$ ，从而 $\sigma(a)/\sigma(s) = \sigma(b)/\sigma(t)$

σ 诱导了 $S^{-1}A$ 的环同态也是显然的。

12.3 $(S^G)^{-1}A^G \cong (S^{-1}A)^G$

取映射 $\rho: (S^G)^{-1}A^G \rightarrow (S^{-1}A)^G: a/s \mapsto a/s$

这个定义是良好的因为 $\sigma(a/s) = \sigma(a)/\sigma(s) = a/s$ ，于是 $a/s \in (S^{-1}A)^G$ 。

映射 ρ 是单同态：因为如果 $\rho(a/s) = 0$ ，那么在 $S^{-1}A$ 中 $a/s = 0$ ，即 $\exists s' \in S, as' = 0$ 。注意此时 $a \in A^G$ ，那么 $\forall \sigma \in G, 0 = \sigma(as') = a\sigma(s')$

于是 $a \cdot \sum_{\sigma \in G} \sigma(s') = 0$ ，并且 $\sum_{\sigma \in G} \sigma(s') \in A^G$ ，另一方面 $\sigma(S) \subseteq S$ ，于是 $\sum_{\sigma \in G} \sigma(s') \in S$ ，从而 $\sum_{\sigma \in G} \sigma(s') \in S^G$ 。故在 $(S^G)^{-1}A^G$ 中 $a/s = 0$

映射 ρ 是满同态：对于任何 $a/s \in (S^{-1}A)^G$ 。由于 $\sigma(a)/\sigma(s) = \sigma(a/s) = a/s$ ，我们断言在 $S^{-1}A$ 中 $(\sum_{\sigma \in G} \sigma(a))/(\sum_{\sigma \in G} \sigma(s)) = a/s$

断言成立，因为假设对每个 $\sigma \in G, s_\sigma(\sigma(a)s - \sigma(s)a) = 0$ ，那么 $[\sum_{\sigma \in G} \sigma(a)s - \sum_{\sigma \in G} \sigma(s)a] \cdot \prod_{\sigma \in G} s_\sigma = 0$

于是 $\rho(\sum_{\sigma \in G} \sigma(a)/\sum_{\sigma \in G} \sigma(s)) = a/s$ 。

因此 ρ 是同构。

13. 记号沿用5.E12，设 $\mathfrak{p}$ 是 A^G 中的素理想， P 是 A 中素理想构成的集合满足其元素的局限是 $\mathfrak{p}$ ，证明 G 在集合 P 上的作用是传递的，于是作为推论得到 P 有限。

证：

对于 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2 \in P$, 设 $x \in \mathfrak{p}_1$ 。于是 $\prod_{\sigma \in G} \sigma(x) \in \mathfrak{p}_1 \cap A^G = \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}_2$, 从而存在一个 σ 使得 $\sigma(x) \in \mathfrak{p}_2$ 。由于对每个 x 均为如此, 于是 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \bigcup_{\sigma \in G} \sigma(\mathfrak{p}_2)$ 。

注意 σ 是自同构于是 $\sigma(\mathfrak{p}_2)$ 是 A 的素理想。由包容引理(1.11), 知 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \sigma(\mathfrak{p}_2)$ 对某个 $\sigma \in G$ 成立。那么由 5.9, 注意 A 在 A^G 上整, 即有 $\mathfrak{p}_1 = \sigma(\mathfrak{p}_2)$ 。从而证明了结论。

14. 设 A 是整闭环, K 是其分式域, L 是其有限正规可分扩张。记 $G = \text{Gal}(L/K)$, B 是 A 在 L 中的整性闭包。证明 $\sigma(B) = B, \forall \sigma \in G$ 并且 $A = B^G$ 。

证:

14.1 $\sigma(B) = B$

对于 $b \in B$, 设它满足 $b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, 于是 $\sigma(b)^n + \sigma(a_1) \sigma(b)^{n-1} + \cdots + \sigma(a_n) = 0$, 即 $\sigma(b)^n + a_1 \sigma(b)^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, 从而 $\sigma(b)$ 也在 A 上整, 故 $\sigma(b) \in B$ 。

同样上述叙述对 σ^{-1} 依然成立, 那么对于 $\sigma(b) \in B$ 有 $b = \sigma(\sigma^{-1}(b)) \in B$, 于是 $\sigma(B) = B$ 。

14.2 $A = B^G$

$B^G = B \cap L^G = B \cap K = A$ 。倒数第二个等号是 Galois 扩张性质, 最后一个等号是因为 A 在 K 中整闭, 如果存在 $k \in K - A$, 并属于 B , 这就说明 k 在 A 上整, 于是只有 $k \in A$, 矛盾。从而只有 $B \cap K = A$ 。

15. A 是整闭环, K 是其分式域, L 是 K 的有限扩张, B 是 A 在 L 中的整性闭包。对于 A 中素理想 $\mathfrak{p}$, 全体满足局限为 $\mathfrak{p}$ 的 B 中素理想 $\mathfrak{q}$ 个数有限。

证:

域论相关: <https://wuli.wiki/changed/PIInsEx.html>

每个有限扩张都可以分解为一次可分扩张再作一次纯不可分扩张。当然此时两个扩张都是有限的, 于是只需证明 L 是 K 的可分扩张和 L 是 K 的纯不可分扩张的情况即可。

a. L/K 是有限可分扩张，于是是单扩张，那么添加其分裂域就有 L 能够被嵌入到某个 Ω 中，且 Ω/K 是有限正规可分扩张。于是由 5.E14 $A = B^G$ ，那么在 5.E13 中收缩到 $A = B^G$ 中某个素理想 $\mathfrak{p}$ 的 B 中素理想个数有限。

b. L/K 是纯不可分扩张。注意零特征域的有限扩张一定是可分的，于是只需考虑有限域。设 $\text{char} K = p$ ，如果 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ ，

对于一个素理想 $\mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ ，若 $x \in \mathfrak{q}$ ，则有 $x^{p^m} \in \mathfrak{p}$ ；反过来若 $x^{p^m} \in \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ ，于是 $x \in \mathfrak{q}$ 。

另一方面 $\{x | \exists m \geq 0, x^{p^m} \in \mathfrak{p}\}$ 的确是一个理想（验证即可）从而说明满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 存在且唯一。于是这就证明了结论。

Noether 正规化定理，零点定理

<https://www.cnblogs.com/XiongRuiMath/p/10289644.html>

16. (Noether 正规化定理) 设 k 是域， $A \neq 0$ 是有限生成 k -代数，则存在 $x_1, \dots, x_d \in A$ ，满足它们在 k 上代数无关，并且 A 在 $k[x_1, \dots, x_d]$ 上整。

即任何一个有限生成 k -代数可以分解为 $k \subseteq_{\text{纯超越}} k[x_1, \dots, x_d] \subseteq_{\text{整}} A$ 。

证：

设 A 由 $y_1, \dots, y_m$ 作为 k 代数生成。

对 m 归纳，

若 $m = 0$ 命题显然。若否，由归纳法只需说明存在子环 $S \subseteq A$ ，满足 S 作为 k -代数由 $m - 1$ 个元素生成，并且 A 在 S 上有限（作为模有限生成）。

这是因为如果 S 满足要求，设对应的 $k[x_1, \dots, x_d] = R$ ， R 当然在 k 上纯超越。又 $R \subseteq_{\text{整}} S \subseteq_{\text{有限}} A$ ，于是 A 在 S 上整。由整性传递性 A 在 R 上整，从而得证。

由于 $y_1, \dots, y_m$ 如果代数无关，命题已经自然成立（取 $x_i = y_i$ ）。故可以假设存在 $f \in k[T_1, \dots, T_m]$ ，使得 $f(y_1, \dots, y_m) = 0$

首先待定 r ，记 $z_i = y_i - y_1^{r^{i-1}}$, $2 \leq i \leq m$ ，于是 $f(y_1, z_2 + y_1^r, z_3 + y_1^{r^2}, \dots, z_m + y_1^{r^{m-1}}) = 0$

于是左侧由如下形式的项构成： $ay_1^{\alpha_1} \prod_{i=2}^m (z_i + y_1^{r^{i-1}})^{\alpha_i}$ ，其中系数 $a \in k$ 。那么在这之中 y_1 的最高次项形如 $ay_1^{\alpha_1 + r\alpha_2 + \dots + r^{m-1}\alpha_m}$

可以取 r 使得对于对于每一项的 α_i ，都有 $\alpha_i < r$ ，那么每个 y_1 的最高次项次数各不相同。于是通过将全局最高次的 y_1 项前系数归一，有 y_1 在 $k[z_2, \dots, z_m]$ 上整；同样 $y_2, \dots, y_m$ 由 z_i 的定义自然在 $k[z_2, \dots, z_m]$ 上整。从而 $S = k[z_2, \dots, z_m]$ 即为满足要求的子环 S 。

16Remark. 这个定理的几何解释是： k 是代数闭域， X 是 k^n 中的仿射簇，坐标环 $A \neq 0$ 。那么存在一个 $\dim r$ 的 k^n 线性子空间 L ，以及线性映射 $\phi: k^n \rightarrow L$ ，满足这个映射限制到 X 上仍然是满射。

见本节首的链接。

17a.(Schein零点定理) 给定环 A ，理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$ ，则 $r(\mathfrak{a}) = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}} \mathfrak{p}$

证：（这里写一个迅速的局部化证法：3.11Rmk.

$f \notin r(0) \iff 0 \notin \{1, f, \dots, f^n\} \iff A_f \neq 0$ ， A_f 的极大理想在 A 中的原像为不含 f 的素理想）

17b.(Zariski零点定理 - Zariski引理) 设 k 是域， A 是有限生成 k 代数。如果 A 是域那么它是 k 的有限代数扩张。

证：由Noether正规化， $k \subseteq A$ 可以分解为 $k \subseteq P \subseteq A$ ，其中 A 在 P 上整，并且由代数无关性有 P 同构于 k 上多项式环。由5.7， A 是域，则 P 是域，从而多项式环必然退化成 P 本身。那么 A 在 k 上整，又是有限生成代数，于是是有限代数扩张。

17c.(Weak Nullstellensatz) 对于代数闭域 k ， $k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m} \cong k$ ，其中 $\mathfrak{m}$ 是 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的极大理想。更进一步， $\mathfrak{m}$ 必定有形式 $\langle X_1 - k_1, \dots, X_n - k_n \rangle$

证：同5.25.

17d. (Hilbert Nullstellensatz) 对于域 k ，有限生成 k -代数 A ， $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想，则

$$r(\mathfrak{a}) = \bigcap_{\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}} \mathfrak{m}$$

证：同样不妨 $\mathfrak{a} = 0$ ， $f \notin r(0) \iff A_f \neq 0$. 于是 A_f 存在极大理想，设为 $\mathfrak{m}$ 。其在 A 中的原像是素理想，设为 $\mathfrak{n}$ 。

于是有域 k 出发的环同态（自然是单的） $k \rightarrow A/\mathfrak{n}$ ；并有 $A/\mathfrak{n} \subset \overline{A_f/\mathfrak{m}}$ 。于是 $k \rightarrow \overline{A_f/\mathfrak{m}}$ 是单同态。设 A 由 $x_1, \dots, x_n$ 作为 k -代数有限生成，那么 $A_f/\mathfrak{m}$ 由 $x_1/1, \dots, x_n/1, 1/f$ 作为 k -代数有限生成。于是由Zariski引理， $A_f/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限代数扩张。

于是 $A_f/\mathfrak{m}$ 在 k 上整，当然在 $A/\mathfrak{n}$ 上整，于是由5.7 $A/\mathfrak{n}$ 是域。故 $\mathfrak{n}$ 是极大理想，从而 $f \notin \mathfrak{n}$ ，命题得证。

17e. (Strong Nullstellensatz) 对于代数闭域 k ，理想 $\mathfrak{a} \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$ ，则

$$I(Z(\mathfrak{a})) = r(\mathfrak{a})$$

证：

对于 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n$ ， $(x_1, \dots, x_n) \in Z(\mathfrak{a}) \iff \mathfrak{a} \subseteq \langle X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n \rangle$
(See 5.25 Cor.)

另一方面

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0 \iff f \in \langle X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n \rangle \text{ (See 5.25 Cor.)}$$

于是

$$\begin{aligned} I(Z(\mathfrak{a})) &= \bigcap_{(x_1, \dots, x_n) \in Z(\mathfrak{a})} \langle X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n \rangle \\ &= \bigcap_{\langle X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n \rangle \supseteq \mathfrak{a}} \langle X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n \rangle \\ &= \bigcap_{\text{maximal } \mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}} \mathfrak{m} \text{ (Weak Nullstellensatz)} \\ &= r(\mathfrak{a}) \text{ (Hilbert Nullstellensatz)} \end{aligned}$$

最后一式注意 $k[X_1, \dots, X_n]$ 当然是有限生成 k -代数。

20. 设 A 是整环 B 的子环, 并且 B 在 A 上作为 A -代数有限生成。证明存在 $s \neq 0, s \in A$, $y_1, \dots, y_n \in B$ 在 A 上代数无关, 并且满足 B_s 在 B'_s 上整, 其中 $B' = A[y_1, \dots, y_n]$ 。

证:

取 $S = A - \{0\}$, $K = S^{-1}A$, $S^{-1}B$ 是有限生成 K -代数。由 Noether 正规化定理, 存在 $y_1/s_1, \dots, y_n/s_n \in S^{-1}B$, 在 K 上代数无关, 并且 $S^{-1}B$ 在 $C = K[y_1/s_1, \dots, y_n/s_n]$ 上整。

设 $z_1, \dots, z_m$ 作为 A -代数生成 B , 那么 $z_1/1, \dots, z_m/1$ 在 $K[x_1, \dots, x_n]$ 上整。。

将 $z_i/1$ 对应的零化多项式写出, 即 $p_i(z) = \sum c_{i,j}(z_i/1)^j$

取充分大的 $s \in S$ 使得 $sc_{i,j} \in B'$ (乘以最小公倍数) 那么 $p_i(z) \in B'_s[T]$ 对每个 i 成立, 于是 $z_i/1$ 在 B'_s 上整。另一方面 $B_s = B'_s[z_1/1, \dots, z_m/1]$, 于是由 5.3 得证。

21. 设 A 是整环 B 的子环, 并且 B 在 A 上作为 A -代数有限生成。证明存在 $s \neq 0, s \in A$, 满足如果 Ω 是代数闭域, $f: A \rightarrow \Omega$ 是一个同态满足 $f(s) \neq 0$, 那么 f 可以被延拓为 $B \rightarrow \Omega$ 。

证:

沿用 5.E20 的记号: 首先 f 可以延拓至 B' , 例如将 y_i 映至 0。由 $s \neq 0$ 可以延拓至 B'_s 。

由 5.E2, 可以延拓至 B_s , 于是自然延拓至了 B 。

22. 设 A 是整环 B 的子环, 并且 B 在 A 上作为 A -代数有限生成。如果 $J(A) = 0$, 那么 $J(B) = 0$

证:

取 B 的一个非零元素 v ，需要证明存在一个不包含 v 的极大理想。对 B_v 和子环 A 应用5.E21（整环的局部化仍然是整环），得到了满足要求的 $s \neq 0, s \in A$ 。

设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想， $s \notin \mathfrak{m}$ ，令 $k = A/\mathfrak{m}$ 。那么典范同态复合上嵌入 $A \rightarrow k \rightarrow \bar{k}$ 可以被延拓为 $g: B_v \rightarrow \bar{k}$ 。当然有 $g(v) \neq 0$ ，否则 $g(1/v)$ 不存在。

另一方面 $\text{Im } g \cong B_v / \ker g \cong B / (\ker g \cap B)$

?

Jacobson环

23. 设 A 是环，证明下列等价，称满足这个条件的环为**Jacobson环**：

- a. 每个素理想都是若干极大理想的交。
- b. 每个 A 的同态像的**Jacobson根**和**幂零根**都相同
- c. 每个 A 的非极大的素理想都等于严格包含它的素理想的交。

证：

$b \implies a$. 对于某个素理想 $\mathfrak{p}$ ，考虑 $A/\mathfrak{p}$ ，即证。

$a \implies c$. 显然

$c \implies b$. 首先环的同态像总是同构于某个 A 的商环，过渡到商环，于是可以假设 A 是整环但Jacobson根非零。设 $0 \neq f \in J(A)$ ，于是 $A_f \neq 0$ 。故 A_f 中存在极大理想，设其拉回是 $\mathfrak{p}$ 。那么 $f \notin \mathfrak{p}$ （否则含1），于是 $\mathfrak{p}$ 不是极大的。

另一方面，由于 $\mathfrak{p}$ 是 A_f 中极大理想的拉回，那么严格包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想一定和 $\{f, \dots, f^n, \dots\}$ 有交，于是一定包含 f ，从而与c条件矛盾。

24. 设 A 是Jacobson环, B 是 A -代数, 证明如果以下二者至少成立其一: B 在 A 上整; B 作为 A -代数有限生成, 那么 B 是Jacobson环。

特别地, 每个有限生成环, 和域的有限生成代数是Jacobson环。

证:

25. 设 A 是环, 证明以下两者等价:

1. A 是Jacobson环; 2. 每个有限生成 A -代数 B 如果是域, 那么作为 A 模有限生成。

证:

1 $\implies$ 2.

设代数 $f: A \rightarrow B$, A 的同态像为 $A' \subseteq B$ (故 A' 是整环), 并且 A' 仍然是Jacobson环。因此可设 $A \subseteq B$, 且 A 整。

由5.E21, 存在 $s \in A$ 满足要求, 且 $s \neq 0$ 。现在考虑 A 的Jacobson根:

$J(A) = \mathfrak{R}(A) = (0)$, 于是 $s \notin J(A)$, 故存在极大理想 $\mathfrak{m} \not\ni s$ 。于是考虑同态 $A \rightarrow A/\mathfrak{m} (= k) \hookrightarrow \bar{k}$, 那么它可延拓为 $g: B \rightarrow \bar{k}$ 。由于 B 是域, 于是 g 是单同态, 故 B 在 k 上整。即 B 在 A 上整, 回忆5.3后Remark (有限型+整=有限) 有 B 是有限生成 A 模。

2 $\implies$ 1.

利用23.3判别:

考虑 A 的非极大的素理想 $\mathfrak{p}$, $B = A/\mathfrak{p}$ 。设 f 是 B 的非零元素。那么 B_f 是有限生成 A 代数。如果 B_f 是域, 那么它是有限生成 A 模, 从而在 B 上整。由5.7 B 是域, 和 $\mathfrak{p}$ 非极大矛盾, 故 B_f 不是域, 从而含有一个非零素理想, 将其拉回至 B , 设为 $\mathfrak{p}'$, 那么 $f \notin \mathfrak{p}'$ 。

从而 B 中的全体非零素理想的交是0。

因而 $\mathfrak{p}$ 是全体严格包含其的素理想的交。

26. 对于拓扑空间 X ，称它的子集是局部闭的如果它是一个开集和闭集的交，或者等价地：它在它的闭包内是开的。

证明对于 $X_0 \subseteq X$ ，以下三者等价

1. 每个非空局部闭集与 X_0 有交；2. 对每个闭集 $E, \overline{E \cap X_0} = E$ ；3. X 中开集到 X_0 中开集（子空间拓扑）的映射： $U \mapsto U \cap X_0$ 是双射。

称满足要求的集合 X_0 是相当稠密集。

证：

1 $\implies$ 2.

首先显然有 $\overline{E \cap X_0} \subseteq E$ ，另一方面对于任何 $x \in E$ ，开邻域 $x \in U$ 。那么 $U \cap E$ 是非空局部闭集，进而和 X_0 有交，进而 U 和 X_0 有交，于是说明 $x \in \overline{E \cap X_0}$ ，故 $\overline{E \cap X_0} = E$

2 $\implies$ 3.

子空间拓扑的定义保证了这个映射是满的。接下来说明它是单的：如果 $U \cap X_0 = V \cap X_0$ ，进而 $X - U = \overline{(X - U) \cap X_0} = \overline{(X - V) \cap X_0} = X - V$ ，故 $U = V$ 。

3 $\implies$ 1.

考虑非空局部闭集 $U \cap V$ (U open, V closed)。

由于 $U \neq \emptyset$ ，由双射条件知 $U \cap X_0 \neq \emptyset$ 。而 $U \cap V \neq \emptyset$ ，如果 $V \cap (U \cap X_0) = \emptyset$ ，于是 $U \cap X_0 \subseteq X - V$ 。那么 $[(X - V) \cap U] \cap X_0 = U \cap X_0$ ，从而只有 $(X - V) \cap U = U$ ，即 $X - V \supseteq U$ 。这和 $U \cap V \neq \emptyset$ 矛盾。

接下来的命题将会指出 Jacobson 环的素谱具有的拓扑性质：

对于一个环 A ，以下三者等价：

1. A 是 Jacobson 环；2. A 的极大理想点构成的集合是相当稠密集；3. $\text{Spec}(A)$ 的每个单点局部闭集都是闭的。（这是 23 的几何解释）

证：

1 $\iff$ 2.

记极大理想点集为 $Max(A)$. 对于任何理想 $\mathfrak{a}$, 考虑 $V(\mathfrak{a}) \cap Max(A)$, 它的闭包也是 $V(\mathfrak{a})$. 设包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想的交都是 $\mathfrak{b}$, 如果 $r(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{b}$

那么 $V(\mathfrak{b}) \supseteq V(\mathfrak{a}) \cap Max(A)$, 但 $V(\mathfrak{b}) \subset V(\mathfrak{a})$, 这与闭包的定义矛盾, 于是只能 $\mathfrak{b} = r(\mathfrak{a})$, 即等价于 A 的每个同态像中 Jacobson 根和幂零根相同。由 5.E23.2 即证。

1 $\implies$ 3.

设 $\{\mathfrak{p}\} = V(\mathfrak{a}) - V(\mathfrak{b})$, 那么记 $Q = \{\mathfrak{q} | \mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}\}$, $Q \subseteq V(\mathfrak{a})$, 于是 $Q \subseteq V(\mathfrak{b})$, 故 $\mathfrak{b} \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}} \mathfrak{q} \xrightarrow{\text{Jacobson Ring}} \mathfrak{p}$, 那么 $\{\mathfrak{p}\} \in V(\mathfrak{b})$, 矛盾!

3 $\implies$ 1.

若对于某个非极大理想 $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p} \subset \bigcap_{\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}} \mathfrak{q}$, 则 $\{\mathfrak{p}\} = V(\bigcap_{\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}} \mathfrak{q}) - V(\mathfrak{p})$, 于是 $\mathfrak{p}$ 极大, 矛盾。

赋值

27. 设 A, B 是两个局部环, B 被称为优于 A 如果 $A \subseteq B$, 并且 A 中的极大理想 $\mathfrak{m}$ 被 B 中极大理想 $\mathfrak{n}$ 包含 (或更准确地 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A$)。设 K 是域, Σ 是 K 的全体子局部环。给 Σ 赋以优序, 证明 Σ 有极大元, 并且 $A \in \Sigma$ 极大 $\iff A$ 是 K 的赋值环。

证:

极大元存在:

考虑升链 $(A_1, \mathfrak{m}_1) \subset \cdots \subset (A_n, \mathfrak{m}_n) \subset \cdots$.

考虑 $k_i = A_i / \mathfrak{m}_i$, 因而存在 $k_i \rightarrow k_{i+1}$ 的同态。由于 k 是域, 只能有这些同态是嵌入。

因而存在正向系统之间的正合列 $0 \rightarrow \mathbf{m} \rightarrow \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{k} \rightarrow 0$. 从而正向极限之间存在正合列 $0 \rightarrow \bigcup \mathfrak{m}_i \rightarrow \bigcup A_i \rightarrow \bigcup k_i \rightarrow 0$.

因而 $\bigcup \mathfrak{m}_i$ 是 $\bigcup A_i$ 的极大理想, 接下来证明它是局部环。

由1.6.2, $1 + \cup \mathfrak{m}_i$ 中元素设为 $1 + m$, 必然有 $m \in \mathfrak{m}_i$, 于是 $1 + m$ 在 A_i 中是单位, 进而在 $\cup A_i$ 中是单位, 从而说明了局部环。

赋值环:

$A \in \Sigma \text{极大} \implies \text{赋值环}$

记 $\Omega = \bar{K}$, 考虑同态 $f: A \rightarrow A/\mathfrak{m} \hookrightarrow \Omega$ (注意到 $A/\mathfrak{m}$ 可以嵌入到 K , 于是嵌入到 Ω)

回忆5.3节赋值环的构造, 如果存在 $(A', f') > (A, f)$, 无妨将 (A', f') 取为一个极大元, 于是由5.19它是局部环, 并且 $f'|_A = f$ 。那么极大理想 $\mathfrak{n} = \ker f'$ 当然满足 $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$, 与 $A \in \Sigma \text{极大}$ 矛盾。

于是 (A, f) 在5.3节序关系中极大, 于是由5.21是赋值环。

赋值环 $\implies A \in \Sigma \text{极大}$

现在假定 A 是赋值环, 如果局部环 B 优于 A , 那么 $A \subset B \subset K$ 。由5.18.2, A, B 都是局部环。

考虑 $(A, \mathfrak{m}), (B, \mathfrak{n})$, 由5.18.1的证明, $\mathfrak{m}$ 是 $x \in A, x^{-1} \notin A$ 的 x 构成的集合。于是对其扩环必定会导致 $x \in A, x^{-1} \in B$ 的情形出现。因此 $\mathfrak{n}$ 反而要小于 $\mathfrak{m}$ 。从而只能 $A = B$

28. 设 A 是整环, K 是分式域, 证明以下两者等价:

1. A 是 K 的赋值环; 2. $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 A 的理想, 则 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}, \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ 必定出现其一。

自然地作为推论 $A/\mathfrak{p}$ 和 $A_{\text{mathfrak{p}}}$ 都是它们各自分式域中的赋值环。

证:

1 $\implies$ 2.

若否, 设 $x \in \mathfrak{a} - \mathfrak{b}, y \in \mathfrak{b} - \mathfrak{a}$, 自然 $x, y \neq 0$ 。由于 $x/y \in K$, 无妨 $x/y \in A$ 。那么 $\mathfrak{b} \ni y \cdot x/y = x \in \mathfrak{a} - \mathfrak{b}$, 矛盾。

2 $\implies$ 1.

对于 $a/b \in K^\times$ ，只要 $(a) \subseteq (b)$ 就有 $b/a \in A$ ，反之 $a/b \in A$ ，得证。

29. 设 A 是 K 的赋值环，那么每个包含 A 的 K 的子环都是 A 的某个局部化。

证：

设子环为 B ，5.18 保证 B 是赋值环，进而是局部环。设 B 的极大理想是 $\mathfrak{n}$ ， A 的极大理想是 $\mathfrak{m}$ 。由 5.E27.2 的讨论知 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{m}$ 。那么 $\mathfrak{n} = \mathfrak{n} \cap A$ 是 A 的素理想。我们证明 $B = A_{\mathfrak{n}}$

这是显然的，只需将局部环嵌入到分式域中立即得证。

（注意有如下关系：

$$\begin{array}{ccccc}
 \longleftarrow & A & \longrightarrow & & \\
 & \mathfrak{m} & & A^\times & \\
 \hline
 & \mathfrak{n} & & B^\times & \\
 & & & & \mathfrak{n}^{-1} \\
 \hline
 \longleftarrow & B & \longrightarrow & &
 \end{array}$$

)

30. (赋值环 $\rightarrow$ 赋值) 设 A 是 K 的赋值环， A 的单位群 U 是 K^* 的子群。

令 $\Gamma = K^*/U$, 设 $\xi, \eta \in \Gamma$, 被 $x, y \in K$ 代表。定义 $\xi \geq \eta$ 如果 $xy^{-1} \in A$ (很容易验证这是良定义的) 证明这是全序, 并且和群乘法相容: $\xi \geq \eta \implies \xi\omega \geq \eta\omega$ 。于是我们得到了一个全序 **Abel** 群, 称为环 A 的值群。

$v: K^* \rightarrow \Gamma$ 记为自然同态, 证明 $\forall x, y \in K^*, v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$

证:

全序显然, 相容性显然。

下面证明不等式。不妨 $v(x) \geq v(y)$, 则 $(x+y)y^{-1} = xy^{-1} + 1 \in A$ 。

31. (赋值 $\rightarrow$ 赋值环) 设 Γ 是一个全序 **Abel** 群, 群运算以加法记。设 K 是一个域, 那么它的赋值被定义为一个映射 $v: K^* \rightarrow \Gamma$, 满足: 1. $v(xy) = v(x) + v(y)$; 2. $v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$ 。

证明全体满足 $v(x) \geq 0$ 的元素构成一个赋值环, 并且 $v(K^*)$ 正好构成了对应的值群。

证:

首先这样的元素对加法和乘法封闭, $v(1) = 0$ 。 $2v(-1) = v(1) = 0$, 故元素对加法逆封闭, 于是说明了它构成环。

它是赋值环是因为 $0 = v(1) = v(x) + v(x^{-1})$, 于是至少存在一个大于 0, 故 x, x^{-1} 至少存在一属于这个环, 从而是赋值环。记这个环为 A 。

另一方面 $v(x) = 0 \iff v(x) \geq 0, v(x^{-1}) \geq 0 \iff x \in A^* = U$, 并且 v 当然是群同态, 于是当然有 $v(K^*) \cong K^*/U$, 并且序关系相容。于是这说明了 5.E30 和 5.E31 内容的等价性。

32. 设 Γ 是全序 **Abel** 群。称子群 Δ 是孤立的如果 $0 \leq \beta \leq \alpha, \alpha \in \Delta \implies \beta \in \Delta$

设赋值环 A (w.r.t. 域 K), 值群 Γ 。如果 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 证明 $v(A - \mathfrak{p})$ 是某个孤立子群 Δ 和非负 (即 ≥ 0) 元素的交。

这样诱导出了 $\text{Spec}(A)$ 到全体孤立子群的映射, 证明这个映射是双射。

研究 $A/\mathfrak{p}, A_{\mathfrak{p}}$ 的值群。

证:

32.1 如果一个子群的非负部分被确定了, 那么这个子群就被唯一确定了。于是只需考虑 $v(A - \mathfrak{p})$ 是否满足孤立条件。

设 α 的代表元为 $x \in A - \mathfrak{p}$, β 代表元为 y , 那么 $y \in A$, $xy^{-1} \in A$ 。若 $y \in \mathfrak{p}$, $x = xy^{-1}y \in \mathfrak{p}$, 矛盾。于是 $y \in A - \mathfrak{p}$, 从而验证了孤立条件。

32.2

单射: 如果 $\Delta(\mathfrak{p}) = \Delta(\mathfrak{q})$

于是 $\forall x \in A - \mathfrak{p}, \exists y \in A - \mathfrak{q}$ 满足 $v(x) = v(y)$, i.e. $v(xy^{-1}) = 0$, 即 x, y 相差一个单位。然而 $A - \mathfrak{p}, A - \mathfrak{q}$ 分别乘以单位群后都不动, 于是这说明 $A - \mathfrak{p} \subseteq A - \mathfrak{q}$ 。类似地存在反包含关系, 于是 $A - \mathfrak{p} = A - \mathfrak{q}$, 从而得证。

满射: 给定 Δ , 考虑 $\mathfrak{p} = A - v^{-1}(\Delta)$, 需要证明这是素理想。首先当然 $0 \in \mathfrak{p}$ 。若 $x, y \in \mathfrak{p}, x + y \notin \mathfrak{p}$, 那么由 $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$ 及孤立条件知至少有一 (设为 x) 满足 $v(x) \in \Delta$, 即 $x \notin \mathfrak{p}$, 矛盾。

若 $x \in \mathfrak{p}, a \in A$, 但是 $ax \notin \mathfrak{p}$, 于是 $v(ax) = v(x) + v(a)$, 即 $v(ax) \geq v(x) \geq 0$, 故 $v(x) \in \Delta$, 即 $x \notin \mathfrak{p}$, 矛盾。

若 $x, y \notin \mathfrak{p}, xy \in \mathfrak{p}, v(xy) = v(x) + v(y)$ 。而 $v(x), v(y) \in \Delta$, 于是只能有 $v(xy) \in \Delta$, 矛盾。从而 $\mathfrak{p}$ 的确是素理想, 得证。

32.3

设 $\mathfrak{p}$ 对应的孤立子群为 Δ 。

结论 $A/\mathfrak{p} : \Delta; A_{\mathfrak{p}} : \Gamma/\Delta$

33. (值群构造赋值) 设 Γ 是全序Abel群。接下来从 Γ 构造出域 K 和赋值 v 。设 k 是任意域， $A = k[\Gamma]$ 是群代数，那么 A 是 k -线性空间。基为 $x_\alpha, \alpha \in \Gamma$ ，说明 A 是整环。

如果 $u = \lambda_1 x_{\alpha_1} + \cdots + \lambda_n x_{\alpha_n}$ 是 A 的非零元素，并且 $\lambda_i \neq 0, \forall i, \alpha_1 < \cdots < \alpha_n$ ，定义 $v_0(u) = \alpha_1$ 。证明 $v_0 : A - \{0\} \rightarrow \Gamma$ 满足赋值的两个条件。

记 K 为 A 的分式域，证明 v_0 可以被唯一的延拓成 K 的赋值 v ，并且值群恰好为 Γ 。

证：

33.1 考虑指标序最小两项的乘积，对应项的系数就应该是系数乘积，自然非零。

33.2 直接验证即可。

33.3 $v(1/f) = -v_0(f)$ ，经验证的确是赋值。

34. 设 A 是赋值环， K 是分式域。 $f : A \rightarrow B$ 诱导出 $f^* : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是闭映射。那么如果 $g : B \rightarrow K$ 是代数同态（即 $g \circ f$ 是嵌入），那么 $g(B) = A$ 。

证：

设 $C = g(B)$ ，当然 $A \subseteq C$ 。取 C 的极大理想为 $\mathfrak{n}$ ，由于闭映射，那么 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A$ 也是极大理想。因此 $A = A_{\mathfrak{m}}$ ，而 $C_{\mathfrak{n}}$ 优于 $A_{\mathfrak{m}}$ ，于是 $C_{\mathfrak{n}} = A$ ，因此 $C \subseteq A$ ，从而 $A = C$ ，得证。

35. 利用5.E1和5.E3说明 $f : A \rightarrow B$ 是整的， C 是任意 A -代数，那么映射 $(f \otimes 1)^* : \text{Spec}(B \otimes_A C) \rightarrow \text{Spec}(C)$ 。

反过来，如果 $f : A \rightarrow B$ 满足上述条件，且 B 是整环，那么 f 是整的。

证：

正方向是显然的。反过来：

记 $A' = f(A) \subseteq B$, K 是 B 的分式域。欲证整性, 由 5.22, 只需说明 B 在每个包含 A' 的 K 的赋值环中。设 C 是这样的一个赋值环, 那么 $A' \subseteq B, C \subseteq K$ 。那么 $B \times C \rightarrow K$ 是 A 双线性的。于是诱导出了双线性映射 $g: B \otimes_A C \rightarrow K$ 。

现在记 $F = (f \otimes 1): C \rightarrow B \otimes C$, F^* 是闭映射。 $g \circ F: c \mapsto 1_B \otimes c \rightarrow c$, 即给出了单射 $C \hookrightarrow K$ 。5.E34 保证了 $g(B \otimes_A C) = C$, 那么 $g(b \otimes 1_c) \in C$, 故 $B \subseteq C$ 。于是完成了证明。

证明这个结果仍然成立如果 B 只有有限个素理想。

证:

设 $\mathfrak{p}_i$ 是极小素理想, 那么考虑 $A \rightarrow B \rightarrow B/\mathfrak{p}_i$ 。由于 $\text{Spec}(B \otimes_A C) \rightarrow \text{Spec}(C)$ 是闭映射, 而 1.E21.4 保证 $\text{Spec}((B/\mathfrak{p}_i) \otimes C) \rightarrow \text{Spec}(B \otimes C)$ 是闭的, 因而 $\text{Spec}((B/\mathfrak{p}_i) \otimes C) \rightarrow \text{Spec}(C)$ 是闭映射。由前述命题 ($B/\mathfrak{p}_i$ 是整环) 得 $A \rightarrow B/\mathfrak{p}_i$ 是整的。

那么在 $\prod(B/\mathfrak{p}_i)$ 中 $(0, \dots, B/\mathfrak{p}_i, \dots, 0)$ 在 A 上整, 由整元一定构成子环知 $\prod(B/\mathfrak{p}_i)$ 在 A 上整。

由于 $B \rightarrow \prod(B/\mathfrak{p}_i)$ 可分解为 $B \twoheadrightarrow B/\mathfrak{R} \hookrightarrow \prod(B/\mathfrak{p}_i)$, 那么自然 $B/\mathfrak{R}$ 在 A 上整。

设 $\bar{x}$ 满足某个首一 A 系数多项式 $p(x) = \bar{0}, i. e. \in \mathfrak{R}$, 那么 $p(x)^l = 0$, 得证。