

Chapter 7 函数项级数

本章节主要研究的内容为极限的换序和 $C(X)$ 中的一些性质。

1. 换序定理

极限过程的可交换性涉及到许多情况，为了统一地处理它们，采用基上极限的语言叙述。

1.1 集合的基

给定集合 X ，若其子集族 $\mathcal{B}$ 满足：

$$\text{a. } \emptyset \notin \mathcal{B} \quad \text{b. } \forall b_1, b_2 \in \mathcal{B}, \exists b_3 \in \mathcal{B} \text{ 且 } b_3 \subseteq b_1 \cap b_2$$

则称为 X 的一个基。

例：

$$\text{a. 给定 } t \in X \subseteq \mathbb{R}: \mathcal{B} = \{(t - \delta_1, t + \delta_2) \cap X \mid \delta_1, \delta_2 > 0\}$$

$$\text{b. } X \subseteq \mathbb{R} \text{ 且无上界: } \mathcal{B} = \{(a, +\infty) \cap X \mid a \in \mathbb{R}\} \text{ (这可以看做a.中 } t \rightarrow +\infty \text{ 的情况)}$$

$$\text{c. } X \text{ 为 } [a, b] \text{ 上全体带有标记点的分划, 对每个 } \delta > 0:$$

$\mathcal{B}_\delta = \{P \in X \mid \max \text{length}(P) < \delta\}$ ，取 $\mathcal{B} = \bigcup \mathcal{B}_\delta$ （很明显能看出它和Riemann积分的关系）

1.2 基上极限

对于实值函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ， $\mathcal{B}$ 是 X 的一个基。

若： $\exists a \in \mathbb{R}, s.t. \forall \varepsilon > 0, \exists b \in \mathcal{B}$ ，只要 $x \in b$ ，就有 $|f(x) - a| < \varepsilon$ ，则称 a 为 f 在基 $\mathcal{B}$ 上的极限，记作：

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = a \text{ 或 } f(x) \xrightarrow{\mathcal{B}} a$$

于是考虑1中的三个例子：

a. f 在 $\mathcal{B}$ 上的极限即为: $\lim_{x \rightarrow t} f(x)$

b. f 在 $\mathcal{B}$ 上的极限即为: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

c. 取函数 $\sigma(P) = \sum f(c_k)\Delta_k$, 那么 σ 在 $\mathcal{B}$ 上的极限即为Riemann积分 $\int_a^b f(x)dx$

1.3 换序定理

这是换序的核心定理, 简单说就是一个 n 重极限过程可换序可由其中 $n - 1$ 个极限过程的一致性推出。

(换序定理) 对于 X, Y 上的基 $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$, 它们在 $X \times Y$ 上诱导了一组基
 $\mathcal{B}_{X \times Y} = \{b_X \times b_Y | b_X \in \mathcal{B}_X, b_Y \in \mathcal{B}_Y\}$

对于 $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, 若 $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_X} F_1(y)$

(即: $\forall \varepsilon > 0, \exists b_X \in \mathcal{B}_X$, 只要 $x \in b_X$, 就有 $|f(x, y) - F_1(y)| < \varepsilon$ 对任意 $y \in Y$ 成立)

且: $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} F_2(x)$, 那么:

$$\lim_{\mathcal{B}_X} \lim_{\mathcal{B}_Y} f(x, y) = \lim_{\mathcal{B}_Y} \lim_{\mathcal{B}_X} f(x, y) = \lim_{\mathcal{B}_{X \times Y}} f(x, y)$$

证:

a. $\lim_{\mathcal{B}_X} F_2(x)$ 存在

由于 $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_X} F_1(y): \forall \varepsilon > 0, \exists b_X \in \mathcal{B}_X, \forall x_1, x_2 \in b_X, \forall y \in Y:$

$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

由于 $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} F_2(x): \exists b_{Y_1}, b_{Y_2} \in \mathcal{B}_Y, \forall y \in b_Y \subseteq b_{Y_1} \cap b_{Y_2}:$

$$|f(x_i, y) - F_2(x_i)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (i = 1, 2)$$

于是综合两者, $|F_2(x_1) - F_2(x_2)| < \varepsilon, \forall x_1, x_2 \in b_X$, 从而由Cauchy准则得证, 设这个极限为 A 。

b. $\lim_{\mathcal{B}_Y} F_1(y) = A$

$$\exists b_X \in \mathcal{B}_X, \forall x \in b_X, y \in Y: |f(x, y) - F_1(y)| < \varepsilon/3 \quad (f \Rightarrow F_1)$$

$$\exists b'_X \in \mathcal{B}_X, \forall x \in b'_X : |F_2(x) - A| < \varepsilon/3 \quad (F_2 \rightarrow A)$$

$\exists \mathcal{B}_X \ni b''_X \subseteq b_X \cap b_{X'}$, 以及某个 $x_0 \in b''_X$, 再取 $b_Y \in \mathcal{B}_Y$, 使得 $|F_2(x_0) - f(x_0, y)| < \varepsilon/3 \quad (f \rightarrow F_2)$

综合三者, $\forall y \in b_Y : |F_1(y) - A| < \varepsilon$, 从而得证。

$$\text{c. } \lim_{\mathcal{B}_{X \times Y}} f(x, y) = A$$

这是简单的, 各自选取 X, Y 的基中的元素, 使得 $|f(x, y) - F_1(y)| < \varepsilon/2 \quad (\forall y)$ 且 $|F_1(y) - A| < \varepsilon/2$ 即可。

2. 一致收敛

正如前文所述, 由换序定理知一个 n 重极限过程可换序可由其中 $n - 1$ 个极限过程的一致性推出 (简单归纳), 接下来研究函数列的一致收敛性。

Weierstrass M判别

若 $|f_n(x)| \leq M_n$, 且 $\sum M_n$ 收敛, 则 $\sum f_n$ 的部分和构成的函数列一致收敛。

(考虑Cauchy判别即可)

A-D判别

Abel: **a.** $\sum u_n(x)$ 一致收敛 **b.** 对于每个 x , $v_n(x)$ 单调, 且一致有界

Dirichlet: **a.** $\sum u_n(x)$ 的部分和一致有界 **b.** 对于每个 x , $v_n(x)$ 关于 n 单调, 且 $v_n(x) \Rightarrow 0$

则 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 一致收敛

证明同数值的A-D判别法

前文的换序定理给出了一个直接推论:

连续函数列 $f_n \Rightarrow f$, 则 f 也连续。

自然想问逆命题何时成立, 紧集上是一个情形。

(Dini引理) K 是紧拓扑空间, $\{f_n\}$ 是 K 上的连续实值函数序列, 并且逐点收敛到连续函数 f , 并且满足 f_n 关于 n 逐点单调减, 则这个收敛是一致的。

证: 记 $g_n = f_n - f$, $g_n(x)$ 连续, g_n 关于 n 逐点单调减, 且 g_n 逐点收敛到0, 需证其一致收敛到0

记 $K_n = \{x \in K | g_n(x) \geq \varepsilon\}$, 那么 K_n 闭, 从而紧, 而 g_n 逐点收敛到0, 于是对每个 x 能找到充分大的 N 使 $n \geq N$ 则 $x \notin K_n$, 另一方面有降链 $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots$, 因而 $\bigcap K_n$ 是空的。

但是紧空间中满足有限交性质的闭集族的交不空, 于是族 $\{K_1, \cdots\}$ 不满足有限交性质, 从而存在 $K_N = \emptyset$, 于是 $\forall n > N, g_n(x) < \varepsilon$, 即证。

3. 换序定理应用

3.1 积分-极限

这个问题在实分析中将会被更加细致地研究, 被称之为积分号下取极限, 这里只利用换序定理给出一个很弱的结论。

$f(x, y) : [a, b] \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, 且对每个 y , $f(x, y)$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上Riemann可积, 对于 Y 的基 $\mathcal{B}_Y$, $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} F(x)$

则: $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上Riemann可积, 且 $\int_a^b F(x)dx = \lim_{\mathcal{B}_Y} \int_a^b f(x, y)dx$

证: 在换序定理中, 令 X 和 $\mathcal{B}_X$ 如同1.1.c中那样定义, 取换序定理中的函数为 $\sigma(P, f(x, y))$ 为Riemann和, 于是只需验证 $\sigma(P, f(x, y)) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} \sigma(P, F(x))$

由于: $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} F(x)$

$\exists b_Y \in \mathcal{B}_Y, \forall y \in b_Y, \forall x \in [a, b], |f(x, y) - F(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$

从而: $|\sigma(P, f(x, y)) - \sigma(P, F(x))| \leq \sum |F(c_i) - f(c_i, y)|\Delta_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$, 于是得证。

另外可以看出这个证明可以推广到Riemann-Stieltjes积分。

来看一个稍微强一些的定理：

较弱的Lebesgue控制收敛定理

g 与 $\{f_n\}$ 定义在 $(0, +\infty)$ 上，并且它们在每个内闭区间上Riemann可积，且 $|f_n| \leq g$ ， $\int_0^{+\infty} g(x)dx < +\infty$

且 $\{f_n\}$ 在每个 $(0, +\infty)$ 的紧子集上一致收敛到 f ，那么：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)dx = \int_0^{+\infty} f(x)dx$$

证：这事实上是反常积分-极限换序，为了方便叙述，我们不妨将 $(0, +\infty)$ 拆成两个半开半闭区间，先用基的语言对一个半开半闭区间（不妨 $[1, +\infty)$ ）叙述结论，然后再将两段结果综合即证。

对于 $f(x, y) : [1, +\infty) \times Y \rightarrow \mathbb{R}$

对任何 y ， $f(x, y)$ 关于 x 在任何 $[1, +\infty)$ 内闭区间上Riemann可积，且控制函数保证了反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x, y)dx$ 收敛。

现取 $Y = \mathbb{Z}_{>0}$ ，基 $\mathcal{B}_Y$ 如同1.1.b那样选取，这样就将原定理转换为基的语言。

记： $I(y, u) = \int_1^u f(x, y)dx$ ，其中 $u \in S \stackrel{\Delta}{=} [1, +\infty)$ ， S 中基 $\mathcal{B}_S$ 如同1.1.b那样选取。

则：控制函数保证了 $I(y, u)$ 在基 $\mathcal{B}_S$ 上一致地收敛到 $I(y, +\infty)$

从而由换序定理，只需验证 $I(y, u) \xrightarrow{\mathcal{B}_y} \int_1^b f(x)dx$ ，但这是常义积分-极限换序的结果，于是定理得证。

3.2 求导-极限

$f(x, y) : [a, b] \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ ，且对每个 y ， $f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 连续，在 (a, b) 可导，且 $\exists x_0 \in [a, b]$ 使得 $\lim_{\mathcal{B}_Y} f(x_0, y)$ 存在。

且 $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} \varphi(x)$

则：存在 $F(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} F(x)$ ，且 $F'(x) = \varphi(x)$

证：思路是在换序定理中取函数 $d(h, y) = \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$ ，为证一致收敛性，需先证明 $f(x, y)$ 一致收敛。

由于在点 x_0 ， $\lim_{\mathcal{B}_Y} f(x_0, y)$ 存在，故

$$\exists b_Y \in \mathcal{B}_Y, \forall y_1, y_2 \in b_Y, |f(x_0, y_1) - f(x_0, y_2)| < \varepsilon/2$$

而 $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} \varphi(x)$ ，于是

$$\exists b'_Y \in \mathcal{B}_Y, \forall y_1, y_2 \in b'_Y, \forall x, \left| \frac{\partial}{\partial x} f(x, y_1) - \frac{\partial}{\partial x} f(x, y_2) \right| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

那么对于 $y_1, y_2 \in b_{Y0} \subseteq b_Y \cap b'_Y$

$$\begin{aligned} |f(x, y_1) - f(x, y_2)| &\leq |[f(x, y_1) - f(x, y_2)] - [f(x_0, y_1) - f(x_0, y_2)]| + |f(x_0, y_1) - f(x_0, y_2)| \\ &= \left| \frac{\partial}{\partial x} (f(x, y_1) - f(x, y_2)) \Big|_{x=c \in [x, x_0]} \right| \cdot |x - x_0| + |f(x_0, y_1) - f(x_0, y_2)| \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

于是可设 $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} F(x)$

接下来运用换序定理，取函数 $d(h, y) = \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$ ， $d: H \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 $H = \{h \in \mathbb{R} | x+h \in (a, b)\}$ ，取其基为 $\mathcal{B}_H = (-\delta, \delta) \cap H | \delta > 0$

那么自然 $d(h, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_H} \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$ ，只需 $d(h, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$ ，但这由 $f(x, y) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} F(x)$ 保证，从而得证。

3.3 重积分

$f(x, y): D = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，则 $\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$

证：同3.1一样定义Riemann和函数 $\sigma_x(P, f(x, y)), \sigma_y(Q, f(x, y))$

然后在换序定理中取 X, Y 分别为 $[a, b], [c, d]$ 的带标记点的分划构成的集合，基的取法如同1.1.c。取换序定理中的函数为： $\sigma_x(P, \sigma_y(Q, f(x, y)))$ ，于是由换序定理，只需验证：

$$\sigma_x(P, \sigma_y(Q, f(x, y))) \xrightarrow{\mathcal{B}_Y} \sigma_x(P, \int_c^d f(x, y) dy)$$

但 $f(x, y)$ 一致连续，于是存在 δ ，只要 $|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)| < \delta$ ，就有 $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon$

故可取 $b_Y \in \mathcal{B}_Y$, 使得 $\forall Q \in b_Y, \maxlength(Q) < \delta$

从而, $\forall Q \in b_Y, P \in b_X$

$$\begin{aligned} & |\sigma_x(P, \sigma_y(Q, f(x, y))) - \sigma_x(P, \int_c^d f(x, y) dy)| \\ &= |\sigma_x(P, \sigma_y(Q, f(x, y) - \int_c^d f(x, y) dy))| \leq (b - a)(d - c)\varepsilon \end{aligned}$$

于是得证。

4. $C(X)$ 中函数列的收敛子列: Arzela-Ascoli定理

仿照 $\mathbb{R}$ 中情况, 希望知道实值函数列的收敛子列乃至一致收敛子列的性质, 而后者与 $C(X)$ 中子集的紧性有关。

4.1 $C(X)$ 、上确范数

首先明确研究对象: 对于度量空间 X , 记 $C(X)$ 为全体 X 上连续实值函数构成的集合, 若需要区分实值函数和复值函数时分别用 $C^{\mathbb{R}}(X)$ 和 $C^{\mathbb{C}}(X)$ 表示, 否则默认为实值函数。

$C(X)$ 首先有着明显的线性结构, 同时可以赋予很多种度量结构。本章中赋予的是上确范数从而形成度量空间, 这里上确范数是指 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$, 从而诱导了度量

$$d(f, g) \triangleq \|f - g\|$$

当 X 是紧度量空间时, 上述定义良好, 并且 $(C(X), d)$ 构成完备空间。

$(C(X), d)$ 构成完备空间

证: 设 $\{f_n\}$ 是 $C(X)$ 中Cauchy列, 于是由一致收敛的Cauchy准则, $f_n \Rightarrow f$, 那么 f 连续, 从而得证。

研究上确范数诱导的度量的原因是 $C(X)$ 中序列 f_n 在度量 d 意义下收敛于 $f \iff f_n$ 在 X 上一致收敛于 f 。

同时 $C(X)$ 的闭子集称为一致闭的, $C(X)$ 的子集的闭包称为一致闭包。

4.2 Helly选择定理

首先从一个特例开始，这个特例的证明使用的对角线法将会被反复使用。

$\{f_n\}$ 在可数集 E 上逐点有界，则其有子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 E 上逐点收敛

证：设 $\{x_i\}$ 为 E 的一个列举，由于 $\{f_n(x_1)\}_{n=1}^{+\infty}$ 有界，于是有子列收敛，设为 $\{f_{1,k}(x_1)\}_{k=1}^{+\infty}$

那么在函数列 $S_1 : f_{1,1}, f_{1,2}, \dots$ 中考虑数列 $f_{1,1}(x_2), f_{1,2}(x_2), f_{1,3}(x_3), \dots$ ，也能找到一个子列收敛，设它们所对应的函数列为： $S_2 : f_{2,1}, f_{2,2}, \dots$ ，这样归纳地构造。

那么 S_n 是 S_{n-1} 的子列，且 $\{f_{n,k}(x_n)\}_{k=1}^{+\infty}$ 收敛，并且保持先后顺序。

于是 $f_{1,1}, f_{2,2}, f_{3,3}, \dots$ 即为满足要求的函数列。

(Helly选择定理) $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上单调增函数的序列，且 $\forall x, n : f_n(x) \in [0, 1]$ ，则： $\{f_n\}$ 有一个逐点收敛的子列。

证：由前述结论，有子列 $\{f_{n_i}\}$ 在有理数点收敛，设收敛值为 $f(r)$ ，那么 f 是单调增的。对任意 x ，记 $f(x) = \sup_{\mathbb{Q} \ni r \leq x} f(r)$ ，从而这个 f 是良定义且单调增的。

于是若 f 在点 x 处连续，可选择 $r \leq x \leq s$ ， $r, s \in \mathbb{Q}$ ，使 $f(r) \in [f(x) - \varepsilon, f(x)]$ ， $f(s) \in [f(x), f(x) + \varepsilon]$

另外，对于充分大的 i ， $|f_{n_i}(r) - f(r)| \leq \varepsilon$ ， $|f_{n_i}(s) - f(s)| \leq \varepsilon$ ，于是 $f_{n_i}(r) \in [f(x) - 2\varepsilon, f(x) + \varepsilon]$ ，对于 s 对称同理。

从而 $|f_{n_i}(x) - f(x)| \leq 2\varepsilon$ ，故 f_{n_i} 在点 x 逐点收敛至 f

而单调有界函数的不连续点至多可数，故再次运用前述结论，在 $\{f_{n_i}\}$ 继续选出子列在不连续点集上逐点收敛，从而在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛，得证。

4.3 等度连续, Arzela-Ascoli定理

度量空间 X 上实值函数族 $\mathcal{F}$ 在 x 点等度连续, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t. \forall f \in \mathcal{F}$, 只要 $d(x, x') < \delta$, 就有 $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

若 $\mathcal{F}$ 在 X 中每一点都等度连续, 则称 $\mathcal{F}$ 在 X 上等度连续。

与4.2类似地有:

(Arzela-Ascoli引理) X 为可分度量空间, $\{f_n\}$ 为 $C(X)$ 中逐点有界且等度连续的函数列, 则 $\{f_n\}$ 有一子列逐点收敛到 X 上的实值函数。

证: 对于 X 的可数稠密子集 D , 由4.2中结论, 存在子列 $\{f_{n_i}\}$ 在 D 上逐点收敛到 f , 不妨记这个子列为 $\{f_n\}$.

对于每个 $x_0 \in X$, 存在 δ 使得 $\forall x \ s.t. d(x_0, x) < \delta, |f_n(x_0) - f_n(x)| < \varepsilon/3$ 对所有指标 n 满足。而 D 稠密, 于是 $\exists d \in D, d(x_0, d) < \delta$ 。同时选择充分大的 n, m 使 $|f_n(d) - f_m(d)| < \varepsilon/3$

于是 $|f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon$, 故逐点收敛, 得证。

紧度量空间 X 上 $\{f_n\} \subseteq C(X)$ 若逐点收敛, 则: $\{f_n\}$ 一致收敛 $\iff \{f_n\}$ 在 X 上等度连续

证: ($\implies$) 存在 N 使得 $n > N$ 则 $\|f_n - f_N\| < \varepsilon$, 而紧集上连续函数一致连续, 于是存在 δ , 只要 $d(x, y) < \delta$ 且 $i = 1, \dots, N$, 就有 $|f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$.

若 $n > N$:

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq |f_n(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_n(y)| < 3\varepsilon$$

于是综合两者就得到等度连续。

($\impliedby$) 紧集上等度连续则一致等度连续, 于是 $\exists \delta > 0 \ s.t. \forall n \forall d(u, v) < \delta$, 有 $|f_n(u) - f_n(v)| < \varepsilon$

紧度量空间是全有界的, 从而能被有限 δ -网覆盖, 设为 $B(x_i, \delta)$

则对于每个 i , $\{f_n(x_i)\}$ 是Cauchy的, 于是充分大的 n, m , 有 $|f_n(x_i) - f_m(x_i)| < \varepsilon$ 。

那么对每个 x ,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f_m(x_i)| + |f_m(x_i) - f_m(x)| < 3\varepsilon$$

于是它一致收敛。

紧度量空间 X 上 $\{f_n\} \subseteq C(X)$ 逐点有界且等度连续 $\implies \{f_n\}$ 一致有界

证: 紧集上等度连续则一致等度连续, 于是 $\exists \delta > 0$ s.t. $\forall n \forall d(u, v) < \delta$, 有

$$|f_n(u) - f_n(v)| < \varepsilon$$

紧度量空间是全有界的, 从而能被有限 δ -网覆盖, 设为 $B(x_i, \delta)$, 不妨 $|d(x, x_i)| < \delta$, 于是取 $|f_n(x)| \leq M + \varepsilon$

综合4.2的第一个命题(对角线); A-A引理; 紧度量空间上逐点收敛时一致收敛和等度连续的等价性; 以及有界性的等价命题 可以得到:

(Arzela-Ascoli定理) X 是紧度量空间, $\{f_n\}$ 是 X 上一致有界, 等度连续的实值函数, 于是 $\{f_n\}$ 有子列一致收敛到某个 X 上连续函数, 条件改为逐点有界且等度连续仍然成立。

同时这个定理的逆定理能帮助判断 $C(X)$ 中子集的紧性。

X 是紧度量空间, $\mathcal{F} \subseteq C(X)$, 则: $\mathcal{F}$ 紧 $\iff \mathcal{F}$ 闭, 一致有界且等度连续

证: ($\iff$) 设 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中序列, 则由Arzela-Ascoli定理, 存在子列收敛到 $C(X)$, 而 $\mathcal{F}$ 闭, 从而这个子列也收敛到 $\mathcal{F}$ 。于是 $\mathcal{F}$ 序列紧, 从而紧。

($\implies$) 设 $\mathcal{F}$ 紧, 则 $\mathcal{F}$ 完备, 从而闭。 $\mathcal{F}$ 全有界, 从而一致有界。

若 $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 处不等度连续, 则 $\exists \varepsilon > 0$ s.t. $\forall n, \exists f_n \in \mathcal{F}, x_n \in X$, 使得 $d(x_n, x) < \frac{1}{n}$ 但 $|f_n(x_n) - f_n(x)| \geq \varepsilon$

但是 $\mathcal{F}$ 紧从而序列紧, 于是上述定义的 $\{f_n\}$ 存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 一致收敛到 $f \in C(X)$

于是对于充分大 $k \geq K$, $\|f - f_{n_k}\| < \varepsilon/3$

即: $|f(x) - f_{n_k}(x)| < \varepsilon/3$

$$|f(x_{n_k}) - f_{n_k}(x_{n_k})| < \varepsilon/3$$

但是 $|f_{n_k}(x_{n_k}) - f_{n_k}(x)| \geq \varepsilon$ 且 $d(x_{n_k}, x) < 1/n_k$

从而 $|f(x) - f(x_{n_k})| > \varepsilon/3$ 但 $d(x_{n_k}, x) < \frac{1}{n_k}$ ，与 f 连续性矛盾，得证。

5. Weierstrass逼近、Stone-Weierstrass定理

5.1 Dirac函数列：Weierstrass逼近、Fejer定理

Dirac函数列（也称Delta函数列）指一族非负实值连续函数 φ_n ，满足：

a. 对于每个 n ， $\int_{\mathbb{R}^m} \varphi_n(x) dx = 1$

b. 对于每个 $\delta > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{|x| > \delta} \varphi_n(x) dx = 0$

（Dirac列卷积逼近）若 f 是 $\mathbb{R}^m$ 上连续有界的函数，则 $\varphi_n * f$ 在 $\mathbb{R}^m$ 的每个紧子集上一致收敛到 f

证：设紧集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ ，对于 $x \in \Omega$ ：

$$\begin{aligned} & |f(x) - (f * \varphi_n)(x)| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^m} [f(x) - f(x-t)] \varphi_n(t) dt \right| \\ &\leq \left| \int_{|t| \leq \delta} [f(x) - f(x-t)] \varphi_n(t) dt \right| + \left| \int_{|t| \geq \delta} [f(x) - f(x-t)] \varphi_n(t) dt \right| \end{aligned}$$

对于第一项，由于 f 连续，且 Ω 紧从而有界，于是可以取充分小 δ 使得对每个 $x \in \Omega$ ， $|f(x) - f(x-t)| < \varepsilon/2$ ，于是第一项 $\leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|t| \leq \delta} \varphi_n(t) dx \leq \varepsilon/2$

对于第二项， $|f(x) - f(x-t)|$ 一致有界，于是可取充分大 n ，从而使第二项小于 $\varepsilon/2$

于是完成了证明。

那么Weierstrass逼近定理就几乎完成了。

（Weierstrass逼近定理， $\mathbb{R}^1$ 版本）定义在 $\mathbb{R}^1$ 中紧集上的连续函数可以被多项式一致逼近

证：不妨 $\Omega \subseteq [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ ，取Dirac函数列为：

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{I_n}(1-x^2)^n & |x| \leq 1 \\ 0 & otherwise \end{cases} \quad (Landau)$$

其中归一化系数 $I_n = \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx$ ，可以验证它的确是一个Dirac函数列。

将 f 连续延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上，由Tietze延拓，可以使 f 有界（当然 $\mathbb{R}^1$ 的情况下完全不用考虑Tietze延拓）

那么 $f * \varphi_n$ 在紧集 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上一致收敛到 f 上，而且 $f * \varphi_n$ 事实上是常义积分（充分大后则为0），于是可知每个 $f * \varphi_n$ 都是多项式，从而得证。

（Weierstrass逼近定理， $\mathbb{R}^m$ 版本） 定义在 $\mathbb{R}^m$ 中紧集上的连续函数可以被多项式一致逼近

证：同样，不妨 $\Omega \subseteq [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^m$ ，取Dirac函数列为

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{I_n} \prod_{i=1}^m (1-x_i^2)^n & |x| \leq 1 \\ 0 & otherwise \end{cases} \quad (Landau)$$

接下来证明同前，值得注意的是这里Tietze延拓发挥了作用。

同样，Fourier分析中重要的定理：Fejer定理也可以被如此证明。

这里的Dirac函数列被定义为：一族非负实值连续周期函数 φ_n ，满足：

a. 对于每个 n ， $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_n(x) dx = 1$

b. 对于每个 $\delta > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \varphi_n(x) dx = 0$

c. 周期 $T = 2\pi$

那么有类似的卷积逼近定理：

（Dirac列卷积逼近，三角版本） 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上连续复值函数，且有周期 2π ，则 $\varphi_n * f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f

(这里的卷积指: $f * g(x) \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t)dt$)

证: 设紧集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$, 对于 $x \in \Omega$:

$$\begin{aligned} & |f(x) - (f * \varphi_n)(x)| \\ &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x-t)]\varphi_n(t)dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_{|t| \leq \delta} [f(x) - f(x-t)]\varphi_n(t)dt \right| + \left| \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} [f(x) - f(x-t)]\varphi_n(t)dt \right| \end{aligned}$$

对于第一项, 由于 f 连续, 从而在 $[-\pi, \pi]$ 上一致连续, 又有周期性, 于是可以取充分小 δ 使得对每个 $x \in \Omega$, $|f(x) - f(x-t)| < \varepsilon/2$, 于是第一项 $\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \int_{|t| \leq \delta} \varphi_n(t)dx \leq \varepsilon/2$

对于第二项, $|f(x) - f(x-t)|$ 一致有界, 于是可取充分大 n , 从而使第二项小于 $\varepsilon/2$

于是完成了证明。

对于 $\mathbb{R}$ 上连续复值函数 f , 且有周期 2π , 记:

$$D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \quad (x \in 2\pi\mathbb{Z} \text{ 时延拓为 } 2n+1)$$

$$\begin{aligned} K_m(x) &= \frac{1}{m} \sum_{n=0}^{m-1} D_n(x) \\ &= \frac{1}{m \sin \frac{x}{2}} \sum_{n=0}^{m-1} \sin \frac{2n+1}{2}x = \frac{1 - \cos mx}{2m \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \cos mx}{m(1 - \cos x)} \quad (x \in 2\pi\mathbb{Z} \text{ 时延拓为 } m) \end{aligned}$$

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, \quad \text{其中 } c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt$$

可以验证 $K_m(x)$ 是一组 Dirac 函数列, 于是 $K_m * f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f .

$$\begin{aligned} \text{而 } (D_n * f)(x) &= \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{ik(x-t)} dt = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} = S_n(x), \text{ 同理} \\ (K_n * f)(x) &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} S_n(x) \end{aligned}$$

那么就得到了: **(Fejer定理)** $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} S_n(x) \Rightarrow f(x)$

同时作为推论： $\mathbb{R}$ 上连续复值函数 f ，且有周期 2π ，能被三角多项式一致逼近。

5.2 Stone-Weierstrass定理

现在回来继续研究 $C(X)$ 中的逼近，5.1的定理告诉我们多项式集合是一个可行的逼近集合，自然想考虑它的推广，这正是Stone推广的Weierstrass定理的内容。

考虑最一般的情况： X 是紧Hausdorff空间， $C(X)$ 意义同前。

(引理1) X 至少两个元素， $H \subseteq C(X)$ ，且：

$$a. \forall u, v \in H, \max\{u, v\}, \min\{u, v\} \in H$$

$$b. \forall x_1 \neq x_2 \in X, c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \exists u \in H : s.t. u(x_1) = c_1, u(x_2) = c_2$$

则： H 在 $C(X)$ 中稠密

证：设 $f \in C(X)$ ，固定某个 $x \in X$ ，则对每个 $y \neq x$ ，
 $\exists u_y \in H, u_y(x) = f(x), u_y(y) = f(y)$

记 $O_y = \{x' | f(x') - u_y(x') < \varepsilon\}$ ，那么这是一个包含 x, y 的开集，从而 $X = \bigcup_{y \neq x} O_y$

于是存在有限开覆盖，设为 $O_{y_1}, \dots, O_{y_r}$

令 $v_x = \max\{u_{y_1}, \dots, u_{y_r}\} \in H$ ，那么 $v_x(x) = f(x)$ 且 $\forall x' \in X, f(x) - f(x') < \varepsilon$

现在让 x 变动，同样地，记 $P_x = \{x' | f(x') - v_x(x') > -\varepsilon\}$

同理，存在有限开覆盖，设为 $P_{x_1}, \dots, P_{x_s}$

令 $v = \min\{v_{y_1}, \dots, v_{y_s}\} \in H$ ，那么 $\|f - v\| < \varepsilon$ ，得证。

下面阐述几个定义：

a. $H \subseteq C(X)$ ，若 $\forall x_1 \neq x_2 \in X, \exists h \in H, h(x_1) \neq h(x_2)$ ，则称 H 是分离的。

b. 若 $\forall f, g \in H, \max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in H$, 则称 H 是一个格。

($C(X)$ 的线性子空间是一个格 $\iff$ 若 $h \in H$ 则 $|h| \in H$)

c. $C(X)$ 的线性子空间称为一个子代数, 若它在乘法下封闭。

(引理2) 若 H 是 $C(X)$ 一个分离的线性子空间, 并且包含常值函数, 且是一个格, 则 H 在 $C(X)$ 中稠密。

证: $|X| = 1$ 时平凡, 否则应用引理1, 只需验证b条件。

由于 H 分离, $\exists h, h(x_1) \neq h(x_2)$

则 $\begin{cases} \lambda h(x_1) + \mu = c_1 \\ \lambda h(x_2) + \mu = c_2 \end{cases}$ 有解, 从而 $\lambda h + \mu$ 即满足b的要求。

于是综合几个引理:

(Stone-Weierstrass定理, 实版本, 条件1) $C(X)$ 每个包含常值函数的分离子代数在 $C(X)$ 中稠密。

证: 设这个子代数为 H , 那么它的闭包 $\bar{H}$ 也是一个包含常值函数的子代数 (只需验证子代数, 而有界函数的一致收敛保持乘积, 故的确是子代数)

因此只需证明 $\bar{H}$ 是一个格, 然后运用引理2即证。

由于存在一系列多项式 $\{p_n\}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致地收敛到 $|x|$, 那么 $\{p_n(\frac{f(x)}{\|f(x)\|})\} \Rightarrow \frac{|f(x)|}{\|f(x)\|}$ 在 X 上。

于是 $\{\|f(x)\| \cdot p_n(\frac{f(x)}{\|f(x)\|})\} \Rightarrow |f(x)|$, 但前者的每一项都是 $\bar{H}$ 中元素, 于是若 $f(x) \in H$, $|f(x)| \in H$

从而说明 H 是格, 得证。

这个定理条件还存在变体。

(Stone-Weierstrass定理, 实版本, 条件2) $C(X)$ 每个不在 X 中点消失的分离子代数在 $C(X)$ 中稠密。

证: 我们说明这样的子代数 H 满足引理1.

首先同理条件1中的证明知 H 是格, 只需验证b.

由于 H 分离且在每点都不消失, 则

$$\exists g, h, k \in H, \text{ s.t. } g(x_1) \neq g(x_2), h(x_1) \neq 0, k(x_2) \neq 0$$

$$\text{取 } u(x) = [g(x) - g(x_1)]k(x), \quad v(x) = [g(x) - g(x_2)]h(x)$$

那么 $f(x) = c_1 v(x)/v(x_1) + c_2 u(x)/u(x_2)$ 满足要求。

自然的想法是这个结论能否推广到复值函数, 然而不加强一些条件是不行的。

下文中 $C(X)$ 指 $C^{\mathbb{C}}(X)$

(Stone-Weierstrass定理, 复版本反例, 条件1&2) $C(X)$ 每个不在 X 中点消失的且包含常值函数的分离子代数在 $C(X)$ 中可能不稠密。

设 X 为复平面上单位圆, H 为全体形如 $f(e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^N c_n e^{in\theta}$ 的函数, 它满足条件1和2,

于是 $\forall h \in H, \int_0^{2\pi} h(e^{i\theta}) e^{i\theta} d\theta = 0$, 从而这对于闭包 $\bar{H}$ 中每个元素都成立, 但是考虑 $g(e^{i\theta}) = e^{-i\theta}, \int_0^{2\pi} g(e^{i\theta}) e^{i\theta} d\theta = 2\pi$, 于是 $g \notin \bar{H}$, 从而 H 在 $C(X)$ 中不稠密。

然而加上自共轭条件后定理就可以推广了:

(Stone-Weierstrass定理, 复版本, 条件1或2) $C(X)$ 每个满足条件1或2且自共轭的子集都在 $C(X)$ 中稠密。

证:

条件1: 记 H_0 为 H 中全体实值函数, 那么 H_0 在 $C^{\mathbb{R}}(X)$ 中满足条件1: $f \in H$ 则

$\Re(f), \Im(f) \in H_0$ (考虑 $(f + \bar{f})/2$ 等即可), 那么分离性由 H 的分离性即可推出 (复数不同则实部虚部至少有一不同)

从而 H_0 在 $C^{\mathbb{R}}(X)$ 中稠密, 于是 $H = H_0 + i \cdot H_0$ 自然在 $C(X)$ 中稠密。

条件2的情况是同理的。

参考:

W.Rudin. Principles of Mathematical Analysis

H.L.Royden, P.M.Fitzpatrick Real Analysis

GTM192 Elements of Functional Analysis